

表 2525 透析後体重(kg) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)		3 (1.3)	48 (21.4)	101 (45.1)	52 (23.2)	17 (7.6)	2 (0.9)	1 (0.4)					224 (100.0)		224	46.59	9.19
1.0～ (%)		1 (0.2)	66 (15.1)	181 (41.5)	117 (26.8)	51 (11.7)	16 (3.7)	3 (0.7)	1 (0.2)				436 (100.0)		436	49.90	10.36
2.0～ (%)		6 (0.5)	133 (11.7)	451 (39.5)	354 (31.0)	125 (11.0)	41 (3.6)	25 (2.2)	3 (0.3)	1 (0.1)	2 (0.2)		1,141 (100.0)		1,141	51.11	11.34
3.0～ (%)		7 (0.3)	309 (11.9)	1,065 (41.2)	755 (29.2)	305 (11.8)	104 (4.0)	32 (1.2)	8 (0.3)	1 (0.0)	1 (0.0)		2,587 (100.0)		2,587	50.87	10.70
4.0～ (%)		9 (0.3)	448 (13.2)	1,431 (42.2)	1,004 (29.6)	353 (10.4)	93 (2.7)	40 (1.2)	7 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.0)		3,387 (100.0)		3,387	50.07	10.07
5.0～ (%)		9 (0.3)	474 (16.7)	1,439 (50.7)	677 (23.9)	170 (6.0)	47 (1.7)	19 (0.7)	2 (0.1)				2,837 (100.0)		2,837	47.58	8.84
6.0～ (%)		14 (1.0)	351 (24.0)	757 (51.8)	273 (18.7)	50 (3.4)	12 (0.8)	3 (0.2)					1,460 (100.0)		1,460	45.19	7.90
7.0～ (%)		4 (0.7)	191 (33.6)	285 (50.2)	64 (11.3)	19 (3.3)	2 (0.4)	3 (0.5)					568 (100.0)		568	43.53	7.73
8.0～ (%)		2 (1.1)	78 (44.1)	75 (42.4)	19 (10.7)	3 (1.7)							177 (100.0)		177	41.92	6.59
9.0～ (%)		1 (1.2)	42 (50.6)	28 (33.7)	10 (12.0)	1 (1.2)	1 (1.2)						83 (100.0)		83	41.72	7.87
合計 (%)		56 (0.4)	2,140 (16.6)	5,813 (45.1)	3,325 (25.8)	1,094 (8.5)	318 (2.5)	126 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,900 (100.0)		12,900	48.70	9.99
記載なし (%)	3 (17.6)	5 (29.4)	2 (11.8)	7 (41.2)									17 (100.0)	278	295	30.36	12.73
総計 (%)	3 (0.0)	61 (0.5)	2,142 (16.6)	5,820 (45.1)	3,325 (25.7)	1,094 (8.5)	318 (2.5)	126 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,917 (100.0)	278	13,195	48.68	10.01
平均		4.96	5.11	4.72	4.36	4.11	4.01	4.00	3.77	3.33	3.29		4.61		4.61		
標準偏差		2.08	1.89	1.60	1.45	1.33	1.21	1.24	1.12	1.09	1.00		1.62		1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査