

表 2533 透析後体重(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			4 (40.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	1 (10.0)							10 (100.0)		10	44.47	8.90
0.4～ (%)			1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	2 (33.3)							6 (100.0)		6	53.82	11.97
0.6～ (%)			5 (26.3)	9 (47.4)	1 (5.3)	4 (21.1)							19 (100.0)		19	46.85	11.09
0.8～ (%)		2 (2.4)	12 (14.1)	29 (34.1)	19 (22.4)	13 (15.3)	5 (5.9)	4 (4.7)		1 (1.2)			85 (100.0)		85	52.53	14.18
1.0～ (%)		1 (0.3)	53 (13.4)	110 (27.8)	102 (25.8)	65 (16.5)	36 (9.1)	24 (6.1)	2 (0.5)		2 (0.5)		395 (100.0)		395	54.94	14.54
1.2～ (%)		5 (0.4)	124 (9.1)	425 (31.3)	421 (31.0)	223 (16.4)	112 (8.2)	36 (2.6)	9 (0.7)	2 (0.1)	2 (0.1)		1,359 (100.0)		1,359	54.45	12.51
1.4～ (%)		12 (0.4)	296 (10.7)	1,066 (38.4)	930 (33.5)	338 (12.2)	95 (3.4)	34 (1.2)	7 (0.3)				2,778 (100.0)		2,778	51.26	10.18
1.6～ (%)		9 (0.3)	526 (15.4)	1,683 (49.2)	915 (26.7)	229 (6.7)	43 (1.3)	16 (0.5)	2 (0.1)				3,423 (100.0)		3,423	47.96	8.47
1.8～ (%)		7 (0.3)	509 (21.3)	1,264 (52.9)	485 (20.3)	101 (4.2)	15 (0.6)	6 (0.3)	1 (0.0)				2,388 (100.0)		2,388	45.90	7.79
2.0～ (%)		12 (0.6)	504 (26.5)	998 (52.4)	311 (16.3)	72 (3.8)	6 (0.3)	1 (0.1)					1,904 (100.0)		1,904	44.58	7.51
合計 (%)		48 (0.4)	2,034 (16.4)	5,589 (45.2)	3,187 (25.8)	1,048 (8.5)	312 (2.5)	121 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,367 (100.0)		12,367	48.75	9.99
記載なし (%)	3 (0.5)	13 (2.4)	108 (19.6)	231 (42.0)	138 (25.1)	46 (8.4)	6 (1.1)	5 (0.9)					550 (100.0)	278	828	47.10	10.33
総計 (%)	3 (0.0)	61 (0.5)	2,142 (16.6)	5,820 (45.1)	3,325 (25.7)	1,094 (8.5)	318 (2.5)	126 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,917 (100.0)	278	13,195	48.68	10.01
平均		1.76	1.80	1.75	1.64	1.55	1.42	1.39	1.40	1.20	1.16		1.70		1.70		
標準偏差		0.44	0.34	0.30	0.28	0.30	0.23	0.24	0.20	0.22	0.12		0.32		0.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査