

表 2536 透析後体重(kg) equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			4 (36.4)	5 (45.5)	1 (9.1)	1 (9.1)							11 (100.0)		11	44.56	8.44
0.4～ (%)			3 (25.0)	3 (25.0)	2 (16.7)	4 (33.3)							12 (100.0)		12	50.30	12.57
0.6～ (%)		2 (3.2)	11 (17.5)	25 (39.7)	16 (25.4)	7 (11.1)		2 (3.2)					63 (100.0)		63	48.55	11.43
0.8～ (%)		1 (0.3)	50 (15.5)	101 (31.3)	82 (25.4)	46 (14.2)	24 (7.4)	14 (4.3)	2 (0.6)	1 (0.3)	2 (0.6)		323 (100.0)		323	53.34	14.41
1.0～ (%)		5 (0.4)	156 (11.3)	464 (33.5)	396 (28.6)	203 (14.6)	111 (8.0)	42 (3.0)	7 (0.5)		2 (0.1)		1,386 (100.0)		1,386	53.47	12.60
1.2～ (%)		14 (0.5)	319 (10.5)	1,141 (37.6)	1,016 (33.5)	386 (12.7)	112 (3.7)	39 (1.3)	8 (0.3)	2 (0.1)			3,037 (100.0)		3,037	51.54	10.47
1.4～ (%)		10 (0.3)	590 (15.9)	1,845 (49.6)	969 (26.1)	241 (6.5)	48 (1.3)	13 (0.3)	3 (0.1)				3,719 (100.0)		3,719	47.75	8.38
1.6～ (%)		6 (0.3)	505 (22.3)	1,206 (53.3)	426 (18.8)	98 (4.3)	11 (0.5)	10 (0.4)	1 (0.0)				2,263 (100.0)		2,263	45.69	7.96
1.8～ (%)		3 (0.3)	240 (26.4)	463 (50.9)	170 (18.7)	29 (3.2)	4 (0.4)	1 (0.1)					910 (100.0)		910	44.83	7.63
2.0～ (%)		8 (1.2)	160 (24.4)	340 (51.9)	112 (17.1)	33 (5.0)	2 (0.3)						655 (100.0)		655	45.14	7.78
合計 (%)		49 (0.4)	2,038 (16.5)	5,593 (45.2)	3,190 (25.8)	1,048 (8.5)	312 (2.5)	121 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,379 (100.0)		12,379	48.74	9.99
記載なし (%)	3 (0.6)	12 (2.2)	104 (19.3)	227 (42.2)	135 (25.1)	46 (8.6)	6 (1.1)	5 (0.9)					538 (100.0)	278	816	47.21	10.34
総計 (%)	3 (0.0)	61 (0.5)	2,142 (16.6)	5,820 (45.1)	3,325 (25.7)	1,094 (8.5)	318 (2.5)	126 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,917 (100.0)	278	13,195	48.68	10.01
平均		1.53	1.56	1.53	1.44	1.36	1.25	1.23	1.24	1.09	1.02		1.48		1.48		
標準偏差		0.44	0.32	0.29	0.27	0.28	0.22	0.23	0.19	0.21	0.10		0.30		0.30		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査