

表 2539 透析後体重(kg) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			4 (17.4)	11 (47.8)	6 (26.1)	2 (8.7)							23 (100.0)		23	46.58	8.35
0.4～ (%)		3 (0.7)	71 (17.7)	174 (43.3)	91 (22.6)	39 (9.7)	14 (3.5)	7 (1.7)	3 (0.7)				402 (100.0)		402	49.34	11.70
0.6～ (%)		10 (0.3)	493 (16.5)	1,243 (41.5)	799 (26.7)	305 (10.2)	90 (3.0)	47 (1.6)	5 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.0)		2,994 (100.0)		2,994	49.58	10.69
0.8～ (%)		20 (0.4)	822 (15.3)	2,428 (45.2)	1,461 (27.2)	441 (8.2)	142 (2.6)	48 (0.9)	8 (0.1)	2 (0.0)	3 (0.1)		5,375 (100.0)		5,375	48.96	9.90
1.0～ (%)		12 (0.4)	511 (17.5)	1,400 (48.0)	691 (23.7)	227 (7.8)	55 (1.9)	17 (0.6)	5 (0.2)				2,918 (100.0)		2,918	47.93	9.32
1.2～ (%)		3 (0.5)	117 (19.6)	301 (50.3)	133 (22.2)	32 (5.4)	10 (1.7)	2 (0.3)					598 (100.0)		598	46.67	8.68
1.4～ (%)		1 (1.3)	20 (25.0)	41 (51.3)	12 (15.0)	5 (6.3)	1 (1.3)						80 (100.0)		80	45.72	8.65
1.6～ (%)			3 (37.5)	3 (37.5)	2 (25.0)								8 (100.0)		8	42.65	6.93
1.8～ (%)				1 (100.0)									1 (100.0)		1	46.10	
2.0～ (%)		2 (66.7)		1 (33.3)									3 (100.0)		3	28.23	11.92
合計 (%)		51 (0.4)	2,041 (16.5)	5,603 (45.2)	3,195 (25.8)	1,051 (8.5)	312 (2.5)	121 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,402 (100.0)		12,402	48.74	10.00
記載なし (%)	3 (0.6)	10 (1.9)	101 (19.6)	217 (42.1)	130 (25.2)	43 (8.3)	6 (1.2)	5 (1.0)					515 (100.0)	278	793	47.28	10.28
総計 (%)	3 (0.0)	61 (0.5)	2,142 (16.6)	5,820 (45.1)	3,325 (25.7)	1,094 (8.5)	318 (2.5)	126 (1.0)	21 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.0)		12,917 (100.0)	278	13,195	48.68	10.01
平均		0.98	0.91	0.92	0.89	0.88	0.87	0.84	0.86	0.82	0.79		0.90		0.90		
標準偏差		0.41	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.15	0.18	0.05	0.11		0.18		0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査