

表 2541 透析後体重(kg) %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (0.1)	58 (5.8)	292 (29.1)	347 (34.6)	189 (18.9)	65 (6.5)	31 (3.1)	14 (1.4)	4 (0.4)	1 (0.1)		1,002 (100.0)		1,002	55.83	12.40
60～ (%)		2 (0.2)	27 (3.0)	210 (23.7)	336 (37.9)	177 (20.0)	81 (9.1)	34 (3.8)	12 (1.4)	3 (0.3)	2 (0.2)	2 (0.2)	886 (100.0)		886	58.03	12.70
70～ (%)			38 (2.4)	322 (20.5)	581 (37.0)	342 (21.8)	160 (10.2)	72 (4.6)	42 (2.7)	7 (0.4)	3 (0.2)	4 (0.3)	1,571 (100.0)		1,571	59.74	13.60
80～ (%)			42 (1.7)	492 (19.5)	953 (37.7)	642 (25.4)	238 (9.4)	100 (4.0)	39 (1.5)	13 (0.5)	5 (0.2)	5 (0.2)	2,529 (100.0)		2,529	59.47	12.43
90～ (%)		1 (0.0)	20 (0.6)	514 (16.0)	1,187 (37.0)	898 (28.0)	376 (11.7)	143 (4.5)	43 (1.3)	17 (0.5)	4 (0.1)	5 (0.2)	3,208 (100.0)		3,208	60.67	11.91
100～ (%)			30 (0.8)	465 (12.9)	1,324 (36.9)	1,054 (29.3)	432 (12.0)	177 (4.9)	67 (1.9)	23 (0.6)	13 (0.4)	7 (0.2)	3,592 (100.0)		3,592	61.69	12.37
110～ (%)			16 (0.5)	351 (10.5)	1,212 (36.2)	1,086 (32.4)	458 (13.7)	152 (4.5)	46 (1.4)	18 (0.5)	8 (0.2)	5 (0.1)	3,352 (100.0)		3,352	62.22	11.52
120～ (%)			6 (0.3)	233 (10.0)	804 (34.6)	784 (33.8)	348 (15.0)	93 (4.0)	41 (1.8)	9 (0.4)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,321 (100.0)		2,321	62.48	11.01
130～ (%)			2 (0.2)	80 (6.3)	422 (33.4)	445 (35.2)	212 (16.8)	68 (5.4)	24 (1.9)	6 (0.5)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,263 (100.0)		1,263	63.93	11.16
140～ (%)			5 (0.6)	43 (5.1)	266 (31.7)	317 (37.7)	141 (16.8)	51 (6.1)	14 (1.7)	2 (0.2)		1 (0.1)	840 (100.0)		840	64.09	10.79
合計 (%)		4 (0.0)	244 (1.2)	3,002 (14.6)	7,432 (36.1)	5,934 (28.9)	2,511 (12.2)	921 (4.5)	342 (1.7)	102 (0.5)	41 (0.2)	31 (0.2)	20,564 (100.0)		20,564	61.08	12.15
記載なし (%)	8 (1.1)	2 (0.3)	10 (1.4)	131 (18.1)	251 (34.6)	203 (28.0)	81 (11.2)	26 (3.6)	8 (1.1)	4 (0.6)	1 (0.1)		725 (100.0)	487	1,212	59.02	12.96
総計 (%)	8 (0.0)	6 (0.0)	254 (1.2)	3,133 (14.7)	7,683 (36.1)	6,137 (28.8)	2,592 (12.2)	947 (4.4)	350 (1.6)	106 (0.5)	42 (0.2)	31 (0.1)	21,289 (100.0)	487	21,776	61.01	12.19
平均		66.47	79.98	92.38	101.06	105.68	106.63	103.84	101.88	101.83	101.96	98.05	101.69		101.69		
標準偏差		21.86	31.55	23.97	23.21	22.95	22.92	23.22	23.10	21.71	18.51	19.44	23.86		23.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査