

表 2543 透析後体重(kg) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)			2 (22.2)	3 (33.3)	3 (33.3)	1 (11.1)							9 (100.0)	1	10	49.99	9.24
1.5～ (%)		1 (1.6)	6 (9.8)	28 (45.9)	19 (31.1)	4 (6.6)	2 (3.3)				1 (1.6)		61 (100.0)	1	62	50.03	12.17
2.0～ (%)		2 (0.7)	65 (22.4)	100 (34.5)	92 (31.7)	24 (8.3)	5 (1.7)	2 (0.7)					290 (100.0)	4	294	47.96	9.77
2.5～ (%)	1 (0.1)	9 (0.7)	209 (15.2)	495 (36.0)	423 (30.7)	170 (12.4)	50 (3.6)	13 (0.9)	6 (0.4)				1,376 (100.0)	16	1,392	50.56	10.93
3.0～ (%)		21 (0.2)	766 (8.8)	2,612 (29.8)	2,877 (32.9)	1,643 (18.8)	549 (6.3)	189 (2.2)	55 (0.6)	25 (0.3)	10 (0.1)	7 (0.1)	8,754 (100.0)	53	8,807	54.46	12.22
3.5～ (%)	8 (0.0)	26 (0.1)	1,210 (5.9)	5,013 (24.5)	6,608 (32.3)	4,607 (22.5)	1,926 (9.4)	707 (3.5)	253 (1.2)	66 (0.3)	38 (0.2)	24 (0.1)	20,486 (100.0)	99	20,585	57.28	13.00
4.0～ (%)	2 (0.0)	14 (0.2)	369 (5.2)	1,516 (21.3)	2,175 (30.5)	1,721 (24.2)	805 (11.3)	329 (4.6)	127 (1.8)	49 (0.7)	12 (0.2)	6 (0.1)	7,125 (100.0)	33	7,158	58.99	13.70
4.5～ (%)			16 (5.1)	65 (20.6)	91 (28.9)	80 (25.4)	38 (12.1)	15 (4.8)	10 (3.2)				315 (100.0)	2	317	59.40	13.35
5.0～ (%)				5 (27.8)	7 (38.9)	4 (22.2)	2 (11.1)						18 (100.0)		18	55.81	10.60
合計 (%)	11 (0.0)	73 (0.2)	2,643 (6.9)	9,837 (25.6)	12,295 (32.0)	8,254 (21.5)	3,377 (8.8)	1,255 (3.3)	451 (1.2)	140 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	38,434 (100.0)	209	38,643	56.65	13.04
記載なし (%)	1 (0.2)	3 (0.5)	39 (6.6)	168 (28.6)	195 (33.2)	111 (18.9)	46 (7.8)	18 (3.1)	4 (0.7)	2 (0.3)			587 (100.0)	716	1,303	55.21	12.52
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	3.68	3.45	3.51	3.58	3.63	3.69	3.74	3.75	3.79	3.78	3.68	3.72	3.64	3.53	3.64		
標準偏差	0.36	0.51	0.45	0.41	0.38	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.38	0.26	0.39	0.50	0.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査