

表 2545 透析後体重(kg) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			11 (6.9)	39 (24.4)	41 (25.6)	46 (28.8)	13 (8.1)	7 (4.4)	2 (1.3)			1 (0.6)	160 (100.0)		160	58.07	13.68
7.0～ (%)			22 (8.6)	51 (19.8)	80 (31.1)	61 (23.7)	25 (9.7)	12 (4.7)	3 (1.2)	3 (1.2)			257 (100.0)	2	259	58.25	13.50
7.5～ (%)	1 (0.1)	4 (0.4)	55 (5.8)	196 (20.8)	320 (34.0)	201 (21.3)	105 (11.1)	36 (3.8)	19 (2.0)	4 (0.4)	1 (0.1)		942 (100.0)	9	951	57.90	13.57
8.0～ (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	161 (5.6)	654 (22.9)	900 (31.5)	688 (24.1)	285 (10.0)	105 (3.7)	36 (1.3)	12 (0.4)	5 (0.2)	2 (0.1)	2,853 (100.0)	15	2,868	57.90	12.98
8.4～ (%)		2 (0.2)	53 (6.5)	197 (24.2)	242 (29.8)	197 (24.2)	80 (9.8)	24 (3.0)	11 (1.4)	4 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.2)	813 (100.0)	5	818	57.52	13.55
8.5～ (%)	2 (0.0)	14 (0.2)	582 (6.3)	2,281 (24.7)	2,930 (31.7)	2,012 (21.8)	889 (9.6)	330 (3.6)	127 (1.4)	39 (0.4)	19 (0.2)	10 (0.1)	9,235 (100.0)	66	9,301	57.33	13.26
9.0～ (%)	3 (0.0)	21 (0.2)	755 (6.6)	2,950 (25.7)	3,705 (32.3)	2,477 (21.6)	968 (8.4)	380 (3.3)	133 (1.2)	34 (0.3)	23 (0.2)	15 (0.1)	11,464 (100.0)	51	11,515	56.65	13.02
9.5～ (%)	1 (0.0)	13 (0.2)	550 (7.3)	2,011 (26.5)	2,425 (32.0)	1,601 (21.1)	644 (8.5)	232 (3.1)	60 (0.8)	37 (0.5)	6 (0.1)	5 (0.1)	7,585 (100.0)	27	7,612	56.16	12.84
10.0～ (%)		3 (0.3)	67 (7.5)	245 (27.3)	308 (34.3)	175 (19.5)	68 (7.6)	23 (2.6)	6 (0.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	899 (100.0)	4	903	55.43	12.40
10.1～ (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	198 (8.1)	690 (28.3)	799 (32.8)	459 (18.8)	183 (7.5)	64 (2.6)	33 (1.4)	3 (0.1)	5 (0.2)		2,439 (100.0)	13	2,452	55.34	12.67
10.5～ (%)		5 (0.4)	115 (9.9)	330 (28.5)	357 (30.8)	234 (20.2)	75 (6.5)	29 (2.5)	13 (1.1)	1 (0.1)			1,159 (100.0)	11	1,170	54.61	12.28
11.0～ (%)		1 (0.3)	45 (11.8)	126 (33.1)	111 (29.1)	60 (15.7)	27 (7.1)	7 (1.8)	3 (0.8)	1 (0.3)			381 (100.0)	2	383	52.99	12.31
11.5～ (%)		2 (1.5)	13 (10.0)	36 (27.7)	48 (36.9)	19 (14.6)	8 (6.2)	3 (2.3)		1 (0.8)			130 (100.0)	2	132	53.52	12.10
12.0～ (%)		1 (1.4)	13 (18.6)	25 (35.7)	16 (22.9)	12 (17.1)	3 (4.3)						70 (100.0)	1	71	50.00	11.03
合計 (%)	10 (0.0)	73 (0.2)	2,640 (6.9)	9,831 (25.6)	12,282 (32.0)	8,242 (21.5)	3,373 (8.8)	1,252 (3.3)	446 (1.2)	140 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	38,387 (100.0)	208	38,595	56.64	13.03
記載なし (%)	2 (0.3)	3 (0.5)	42 (6.6)	174 (27.4)	208 (32.8)	123 (19.4)	50 (7.9)	21 (3.3)	9 (1.4)	2 (0.3)			634 (100.0)	717	1,351	55.70	13.08
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	8.91	9.40	9.28	9.24	9.19	9.14	9.12	9.10	9.08	9.06	9.07	9.03	9.19	9.15	9.19		
標準偏差	0.68	0.93	0.81	0.75	0.73	0.74	0.72	0.72	0.72	0.70	0.57	0.60	0.75	0.81	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査