

表 2546 透析後体重(kg) 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)		6 (0.5)	162 (14.4)	359 (31.9)	348 (30.9)	174 (15.5)	57 (5.1)	15 (1.3)	1 (0.1)	3 (0.3)	1 (0.1)		1,126 (100.0)	7	1,133	51.92	11.88
3.0～ (%)		4 (0.3)	150 (9.6)	481 (30.7)	530 (33.8)	286 (18.3)	83 (5.3)	26 (1.7)	5 (0.3)		1 (0.1)		1,566 (100.0)	8	1,574	53.41	10.97
3.5～ (%)	1 (0.0)	7 (0.2)	252 (8.9)	873 (30.8)	932 (32.8)	512 (18.0)	188 (6.6)	53 (1.9)	19 (0.7)	1 (0.0)			2,838 (100.0)	11	2,849	54.01	11.56
4.0～ (%)	1 (0.0)	6 (0.1)	348 (7.7)	1,298 (28.6)	1,478 (32.5)	919 (20.2)	336 (7.4)	110 (2.4)	31 (0.7)	11 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)	4,541 (100.0)	24	4,565	55.16	12.00
4.5～ (%)	2 (0.0)	10 (0.2)	394 (6.9)	1,532 (26.9)	1,843 (32.4)	1,266 (22.3)	414 (7.3)	147 (2.6)	47 (0.8)	16 (0.3)	12 (0.2)	4 (0.1)	5,687 (100.0)	25	5,712	55.91	12.42
5.0～ (%)	3 (0.0)	12 (0.2)	393 (6.4)	1,616 (26.5)	1,938 (31.7)	1,335 (21.9)	559 (9.2)	168 (2.8)	60 (1.0)	14 (0.2)	6 (0.1)	2 (0.0)	6,106 (100.0)	28	6,134	56.34	12.46
5.5～ (%)	2 (0.0)	7 (0.1)	339 (6.4)	1,291 (24.5)	1,697 (32.2)	1,139 (21.6)	496 (9.4)	196 (3.7)	69 (1.3)	20 (0.4)	7 (0.1)	4 (0.1)	5,267 (100.0)	32	5,299	57.16	13.14
6.0～ (%)		2 (0.2)	63 (6.7)	262 (27.7)	276 (29.2)	204 (21.6)	87 (9.2)	28 (3.0)	14 (1.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	5 (0.5)	945 (100.0)	5	950	57.06	14.20
6.1～ (%)	1 (0.0)	6 (0.2)	180 (5.6)	748 (23.2)	1,047 (32.5)	713 (22.1)	318 (9.9)	137 (4.3)	43 (1.3)	19 (0.6)	5 (0.2)	5 (0.2)	3,222 (100.0)	22	3,244	57.92	13.47
6.5～ (%)		5 (0.2)	143 (5.1)	589 (21.1)	891 (31.9)	662 (23.7)	303 (10.9)	126 (4.5)	47 (1.7)	11 (0.4)	9 (0.3)	4 (0.1)	2,790 (100.0)	16	2,806	58.80	13.58
7.0～ (%)	1 (0.1)	4 (0.2)	93 (5.3)	360 (20.4)	536 (30.4)	422 (23.9)	203 (11.5)	89 (5.0)	39 (2.2)	14 (0.8)	1 (0.1)	4 (0.2)	1,766 (100.0)	9	1,775	59.46	14.18
7.5～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	53 (4.8)	195 (17.7)	361 (32.8)	263 (23.9)	130 (11.8)	58 (5.3)	21 (1.9)	11 (1.0)	2 (0.2)	3 (0.3)	1,099 (100.0)	5	1,104	60.07	14.20
8.0～ (%)			34 (5.3)	119 (18.4)	206 (31.9)	145 (22.5)	80 (12.4)	32 (5.0)	19 (2.9)	6 (0.9)	2 (0.3)	2 (0.3)	645 (100.0)	6	651	60.37	14.93
8.5～ (%)		1 (0.2)	21 (5.0)	70 (16.7)	114 (27.3)	106 (25.4)	53 (12.7)	27 (6.5)	15 (3.6)	7 (1.7)	4 (1.0)		418 (100.0)	5	423	62.13	15.56
9.0～ (%)		2 (0.3)	28 (4.1)	109 (16.1)	182 (26.9)	162 (24.0)	100 (14.8)	52 (7.7)	24 (3.6)	7 (1.0)	7 (1.0)	3 (0.4)	676 (100.0)	6	682	63.09	16.51
合計 (%)	12 (0.0)	73 (0.2)	2,653 (6.9)	9,902 (25.6)	12,379 (32.0)	8,308 (21.5)	3,407 (8.8)	1,264 (3.3)	454 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	38,692 (100.0)	209	38,901	56.65	13.04
記載なし (%)		3 (0.9)	29 (8.8)	103 (31.3)	111 (33.7)	57 (17.3)	16 (4.9)	9 (2.7)	1 (0.3)				329 (100.0)	716	1,045	53.43	11.51
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	5.50	5.12	5.03	5.15	5.33	5.46	5.66	5.88	6.15	6.25	6.36	6.51	5.35	5.56	5.36		
標準偏差	1.15	1.61	1.43	1.34	1.40	1.41	1.46	1.53	1.63	1.62	1.82	1.44	1.42	1.55	1.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査