

表 2547 透析後体重(kg) PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		8 (0.5)	156 (9.3)	541 (32.3)	550 (32.8)	261 (15.6)	107 (6.4)	32 (1.9)	16 (1.0)	3 (0.2)	1 (0.1)		1,675 (100.0)	8	1,683	53.69	11.94
20～ (%)		7 (0.3)	197 (9.0)	620 (28.4)	725 (33.2)	405 (18.5)	164 (7.5)	42 (1.9)	16 (0.7)	7 (0.3)		1 (0.0)	2,184 (100.0)	11	2,195	54.58	12.06
40～ (%)		5 (0.2)	193 (7.9)	694 (28.6)	785 (32.3)	492 (20.3)	168 (6.9)	50 (2.1)	27 (1.1)	6 (0.2)	6 (0.2)	2 (0.1)	2,428 (100.0)	9	2,437	55.24	12.68
60～ (%)		6 (0.2)	177 (6.9)	643 (24.9)	888 (34.4)	540 (20.9)	219 (8.5)	83 (3.2)	18 (0.7)	6 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,583 (100.0)	9	2,592	56.16	12.36
80～ (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	216 (7.6)	771 (27.2)	846 (29.9)	621 (21.9)	229 (8.1)	98 (3.5)	26 (0.9)	11 (0.4)	7 (0.2)	2 (0.1)	2,831 (100.0)	15	2,846	56.27	13.11
100～ (%)		4 (0.1)	182 (6.6)	745 (26.8)	887 (31.9)	565 (20.3)	269 (9.7)	76 (2.7)	35 (1.3)	10 (0.4)	2 (0.1)	3 (0.1)	2,778 (100.0)	17	2,795	56.60	12.97
120～ (%)		5 (0.2)	177 (6.9)	631 (24.6)	847 (33.0)	577 (22.5)	209 (8.1)	72 (2.8)	33 (1.3)	9 (0.4)	1 (0.0)	5 (0.2)	2,566 (100.0)	15	2,581	56.60	12.85
140～ (%)		1 (0.0)	148 (6.4)	579 (25.1)	739 (32.0)	519 (22.5)	210 (9.1)	67 (2.9)	32 (1.4)	10 (0.4)	5 (0.2)		2,310 (100.0)	13	2,323	56.88	12.84
160～ (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	124 (5.8)	503 (23.6)	729 (34.2)	452 (21.2)	202 (9.5)	88 (4.1)	19 (0.9)	8 (0.4)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,134 (100.0)	16	2,150	57.30	12.86
180～ (%)		4 (0.1)	311 (6.2)	1,196 (24.0)	1,545 (31.0)	1,157 (23.2)	477 (9.6)	188 (3.8)	65 (1.3)	16 (0.3)	14 (0.3)	6 (0.1)	4,979 (100.0)	26	5,005	57.63	13.33
240～ (%)		1 (1.3)		21 (27.3)	27 (35.1)	19 (24.7)	8 (10.4)				1 (1.3)		77 (100.0)		77	57.45	11.12
241～ (%)	4 (0.1)	5 (0.2)	178 (6.1)	662 (22.5)	906 (30.8)	708 (24.1)	301 (10.2)	102 (3.5)	53 (1.8)	14 (0.5)	2 (0.1)	4 (0.1)	2,939 (100.0)	16	2,955	57.99	13.43
300～ (%)	3 (0.2)	5 (0.3)	91 (5.3)	400 (23.5)	523 (30.7)	400 (23.5)	171 (10.0)	78 (4.6)	17 (1.0)	10 (0.6)	5 (0.3)	2 (0.1)	1,705 (100.0)	9	1,714	58.09	13.63
360～ (%)		3 (0.3)	52 (5.0)	266 (25.7)	324 (31.2)	213 (20.5)	104 (10.0)	56 (5.4)	11 (1.1)	3 (0.3)	4 (0.4)	1 (0.1)	1,037 (100.0)	5	1,042	57.82	13.56
420～ (%)			44 (7.5)	145 (24.7)	188 (32.0)	113 (19.2)	54 (9.2)	25 (4.3)	14 (2.4)	4 (0.7)	1 (0.2)		588 (100.0)	3	591	57.32	14.01
480～ (%)			9 (6.2)	30 (20.5)	57 (39.0)	23 (15.8)	18 (12.3)	5 (3.4)	2 (1.4)	2 (1.4)			146 (100.0)		146	57.78	13.73
500～ (%)		2 (0.9)	16 (6.8)	57 (24.4)	62 (26.5)	50 (21.4)	29 (12.4)	14 (6.0)	3 (1.3)	1 (0.4)			234 (100.0)	3	237	58.21	14.26
540～ (%)	1 (0.4)		11 (4.4)	68 (27.1)	74 (29.5)	58 (23.1)	23 (9.2)	10 (4.0)	4 (1.6)	1 (0.4)	1 (0.4)		251 (100.0)	1	252	57.49	13.53
600～ (%)			28 (6.6)	85 (20.1)	143 (33.8)	94 (22.2)	37 (8.7)	22 (5.2)	10 (2.4)	2 (0.5)		2 (0.5)	423 (100.0)		423	58.61	14.29
800～ (%)		2 (0.6)	33 (9.6)	82 (23.8)	97 (28.1)	68 (19.7)	34 (9.9)	13 (3.8)	10 (2.9)	3 (0.9)	1 (0.3)	2 (0.6)	345 (100.0)	5	350	57.60	15.97
合計 (%)	10 (0.0)	65 (0.2)	2,343 (6.8)	8,739 (25.5)	10,942 (32.0)	7,335 (21.4)	3,033 (8.9)	1,121 (3.3)	411 (1.2)	127 (0.4)	55 (0.2)	32 (0.1)	34,213 (100.0)	181	34,394	56.69	13.07
記載なし (%)	1 (0.2)	2 (0.3)	55 (9.3)	162 (27.5)	199 (33.7)	112 (19.0)	38 (6.4)	11 (1.9)	5 (0.8)	4 (0.7)	1 (0.2)		590 (100.0)	144	734	54.46	12.56
総計 (%)	11 (0.0)	67 (0.2)	2,398 (6.9)	8,901 (25.6)	11,141 (32.0)	7,447 (21.4)	3,071 (8.8)	1,132 (3.3)	416 (1.2)	131 (0.4)	56 (0.2)	32 (0.1)	34,803 (100.0)	325	35,128	56.65	13.06
平均	282.90	175.32	168.99	169.23	173.86	181.61	188.72	207.39	213.94	207.67	204.40	257.28	177.19	190.03	177.26		
標準偏差	118.63	200.16	195.37	173.67	161.94	163.09	160.24	187.41	199.80	165.63	162.03	244.28	169.36	185.65	169.45		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査