

表 2553 透析後体重(kg) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				1 (50.0)	1 (50.0)								2 (100.0)		2	45.95	5.87
60～ (%)		2 (1.8)	17 (14.9)	36 (31.6)	33 (28.9)	17 (14.9)	7 (6.1)			2 (1.8)			114 (100.0)	1	115	52.14	13.22
80～ (%)		2 (0.3)	90 (14.7)	190 (30.9)	204 (33.2)	81 (13.2)	30 (4.9)	13 (2.1)	2 (0.3)	2 (0.3)			614 (100.0)	1	615	51.96	11.77
100～ (%)	1 (0.0)	8 (0.3)	243 (8.7)	884 (31.6)	886 (31.7)	498 (17.8)	182 (6.5)	63 (2.3)	19 (0.7)	2 (0.1)	6 (0.2)	3 (0.1)	2,795 (100.0)	5	2,800	54.28	12.39
120～ (%)	2 (0.0)	12 (0.2)	539 (7.1)	2,110 (27.7)	2,527 (33.1)	1,571 (20.6)	589 (7.7)	186 (2.4)	65 (0.9)	16 (0.2)	9 (0.1)	2 (0.0)	7,628 (100.0)	11	7,639	55.57	12.19
140～ (%)	5 (0.0)	23 (0.2)	735 (6.4)	2,922 (25.6)	3,677 (32.2)	2,538 (22.2)	987 (8.6)	352 (3.1)	121 (1.1)	37 (0.3)	12 (0.1)	9 (0.1)	11,418 (100.0)	15	11,433	56.61	12.72
160～ (%)	2 (0.0)	13 (0.2)	520 (6.3)	1,895 (22.9)	2,630 (31.7)	1,875 (22.6)	822 (9.9)	335 (4.0)	123 (1.5)	43 (0.5)	22 (0.3)	11 (0.1)	8,291 (100.0)	17	8,308	57.87	13.65
180～ (%)		6 (0.2)	188 (6.0)	711 (22.6)	965 (30.6)	710 (22.5)	331 (10.5)	145 (4.6)	65 (2.1)	17 (0.5)	5 (0.2)	8 (0.3)	3,151 (100.0)	3	3,154	58.52	14.13
200～ (%)		2 (0.2)	45 (5.5)	187 (22.8)	260 (31.7)	173 (21.1)	83 (10.1)	42 (5.1)	21 (2.6)	5 (0.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	821 (100.0)	1	822	58.70	14.31
220～ (%)			12 (5.6)	47 (21.8)	60 (27.8)	43 (19.9)	25 (11.6)	17 (7.9)	5 (2.3)	5 (2.3)	1 (0.5)	1 (0.5)	216 (100.0)		216	61.03	16.36
合計 (%)	10 (0.0)	68 (0.2)	2,389 (6.8)	8,983 (25.6)	11,243 (32.1)	7,506 (21.4)	3,056 (8.7)	1,153 (3.3)	421 (1.2)	129 (0.4)	57 (0.2)	35 (0.1)	35,050 (100.0)	54	35,104	56.65	13.07
記載なし (%)	2 (0.1)	8 (0.2)	293 (7.4)	1,022 (25.7)	1,247 (31.4)	859 (21.6)	367 (9.2)	120 (3.0)	34 (0.9)	13 (0.3)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,971 (100.0)	871	4,842	56.43	12.71
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	146.50	144.47	146.73	148.18	150.35	152.15	154.32	157.19	160.23	160.80	156.47	164.51	150.67	147.93	150.67		
標準偏差	16.67	28.24	26.70	25.23	24.81	24.00	24.47	25.35	25.10	27.11	25.91	26.57	25.04	26.02	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査