

表 2556 体重(kg) 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)																	
PD単独 (%)	38 (0.9)	22 (0.5)	152 (3.6)	732 (17.3)	1,242 (29.3)	1,166 (27.5)	598 (14.1)	201 (4.7)	66 (1.6)	12 (0.3)	6 (0.1)	7 (0.2)	4,242 (100.0)	2,946	7,188	59.79	13.95
HD(F)単独.PDカテ あり (%)																	
PD.HD併用週1 HD(F) (%)			17 (1.4)	154 (12.8)	310 (25.8)	406 (33.8)	190 (15.8)	84 (7.0)	29 (2.4)	7 (0.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,200 (100.0)	344	1,544	63.49	12.69
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		1 (1.0)	3 (2.9)	9 (8.8)	25 (24.5)	23 (22.5)	20 (19.6)	11 (10.8)	8 (7.8)	1 (1.0)	1 (1.0)		102 (100.0)	39	141	66.69	16.42
PD.HD併用週3 HD(F) (%)																	
PD.HD併用週4 HD(F) (%)																	
PD.HD併用その他 (%)				9 (17.6)	13 (25.5)	21 (41.2)	3 (5.9)	2 (3.9)	1 (2.0)		1 (2.0)	1 (2.0)	51 (100.0)	12	63	63.93	18.72
合計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,590 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,595 (100.0)	3,341	8,936	60.74	13.90
不明 (%)					1 (100.0)								1 (100.0)	4	5	57.00	
記載なし (%)																	
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査