

表 2560 体重(kg) 原疾患別（腹膜透析患者）

| 原疾患                      | 20未満         | 20～         | 30～          | 40～           | 50～             | 60～             | 70～           | 80～          | 90～          | 100～        | 110～        | 120～       | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均    | 標準偏差  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 慢性糸球体腎炎<br>（％）           | 2<br>(0.1)   | 10<br>(0.5) | 57<br>(2.9)  | 358<br>(18.5) | 595<br>(30.7)   | 564<br>(29.1)   | 248<br>(12.8) | 81<br>(4.2)  | 16<br>(0.8)  | 5<br>(0.3)  | 2<br>(0.1)  | 2<br>(0.1) | 1,940<br>(100.0) | 1,119 | 3,059 | 59.58 | 12.36 |
| 慢性腎盂腎炎<br>（％）            |              |             | 8<br>(12.7)  | 19<br>(30.2)  | 18<br>(28.6)    | 9<br>(14.3)     | 7<br>(11.1)   | 1<br>(1.6)   | 1<br>(1.6)   |             |             |            | 63<br>(100.0)    | 30    | 93    | 53.15 | 13.35 |
| 急速進行性糸球<br>体腎炎<br>（％）    | 1<br>(2.4)   | 1<br>(2.4)  |              | 12<br>(28.6)  | 18<br>(42.9)    | 6<br>(14.3)     | 3<br>(7.1)    | 1<br>(2.4)   |              |             |             |            | 42<br>(100.0)    | 32    | 74    | 54.05 | 11.72 |
| 妊娠腎/妊娠中毒<br>症<br>（％）     |              |             | 2<br>(7.7)   | 10<br>(38.5)  | 7<br>(26.9)     | 6<br>(23.1)     | 1<br>(3.8)    |              |              |             |             |            | 26<br>(100.0)    | 6     | 32    | 52.66 | 10.26 |
| その他の分類不<br>能の腎炎<br>（％）   | 3<br>(5.2)   | 3<br>(5.2)  | 1<br>(1.7)   | 15<br>(25.9)  | 21<br>(36.2)    | 11<br>(19.0)    | 1<br>(1.7)    | 3<br>(5.2)   |              |             |             |            | 58<br>(100.0)    | 27    | 85    | 52.58 | 15.74 |
| 多発性嚢胞腎<br>（％）            | 4<br>(2.6)   |             | 4<br>(2.6)   | 26<br>(17.0)  | 52<br>(34.0)    | 44<br>(28.8)    | 18<br>(11.8)  | 5<br>(3.3)   |              |             |             |            | 153<br>(100.0)   | 90    | 243   | 57.71 | 13.19 |
| 腎硬化症<br>（％）              |              |             | 28<br>(4.0)  | 132<br>(19.0) | 210<br>(30.3)   | 192<br>(27.7)   | 95<br>(13.7)  | 26<br>(3.7)  | 7<br>(1.0)   | 2<br>(0.3)  | 1<br>(0.1)  | 1<br>(0.1) | 694<br>(100.0)   | 389   | 1,083 | 59.48 | 12.65 |
| 悪性高血圧<br>（％）             |              |             | 2<br>(3.0)   | 10<br>(14.9)  | 11<br>(16.4)    | 18<br>(26.9)    | 12<br>(17.9)  | 11<br>(16.4) | 2<br>(3.0)   |             | 1<br>(1.5)  |            | 67<br>(100.0)    | 40    | 107   | 65.87 | 15.72 |
| 糖尿病性腎症<br>（％）            |              |             | 21<br>(1.2)  | 146<br>(8.7)  | 426<br>(25.3)   | 542<br>(32.1)   | 333<br>(19.7) | 131<br>(7.8) | 68<br>(4.0)  | 11<br>(0.7) | 5<br>(0.3)  | 4<br>(0.2) | 1,687<br>(100.0) | 1,079 | 2,766 | 65.43 | 13.46 |
| SLE腎炎<br>（％）             |              |             | 5<br>(12.2)  | 16<br>(39.0)  | 9<br>(22.0)     | 10<br>(24.4)    | 1<br>(2.4)    |              |              |             |             |            | 41<br>(100.0)    | 21    | 62    | 52.54 | 10.79 |
| アミロイド腎<br>（％）            |              |             | 1<br>(25.0)  |               | 1<br>(25.0)     | 2<br>(50.0)     |               |              |              |             |             |            | 4<br>(100.0)     | 5     | 9     | 54.33 | 11.83 |
| 痛風腎<br>（％）               |              |             | 1<br>(3.8)   | 4<br>(15.4)   | 4<br>(15.4)     | 7<br>(26.9)     | 9<br>(34.6)   | 1<br>(3.8)   |              |             |             |            | 26<br>(100.0)    | 7     | 33    | 62.91 | 11.80 |
| 先天性代謝異常<br>による腎不全<br>（％） | 2<br>(15.4)  | 1<br>(7.7)  | 2<br>(15.4)  | 1<br>(7.7)    | 3<br>(23.1)     | 2<br>(15.4)     | 1<br>(7.7)    | 1<br>(7.7)   |              |             |             |            | 13<br>(100.0)    | 5     | 18    | 47.31 | 23.06 |
| 腎・尿路結核<br>（％）            |              |             |              | 1<br>(100.0)  |                 |                 |               |              |              |             |             |            | 1<br>(100.0)     |       | 1     | 48.40 |       |
| 腎・尿路結石<br>（％）            |              |             |              | 2<br>(20.0)   | 3<br>(30.0)     | 4<br>(40.0)     | 1<br>(10.0)   |              |              |             |             |            | 10<br>(100.0)    | 6     | 16    | 58.20 | 9.65  |
| 腎・尿路腫瘍<br>（％）            |              |             | 1<br>(11.1)  | 3<br>(33.3)   | 3<br>(33.3)     | 2<br>(22.2)     |               |              |              |             |             |            | 9<br>(100.0)     | 5     | 14    | 61.21 | 9.53  |
| 閉塞性尿路障害<br>（％）           | 2<br>(12.5)  |             | 3<br>(18.8)  | 2<br>(12.5)   | 5<br>(31.3)     | 2<br>(12.5)     | 2<br>(12.5)   |              |              |             |             |            | 16<br>(100.0)    | 6     | 22    | 55.93 | 21.79 |
| 骨髄腫<br>（％）               |              |             | 3<br>(60.0)  | 1<br>(20.0)   | 1<br>(20.0)     |                 |               |              |              |             |             |            | 5<br>(100.0)     | 3     | 8     | 51.92 | 10.22 |
| 腎形成不全<br>（％）             | 13<br>(24.1) | 4<br>(7.4)  | 4<br>(7.4)   | 16<br>(29.6)  | 7<br>(13.0)     | 5<br>(9.3)      | 1<br>(1.9)    | 1<br>(1.9)   | 2<br>(3.7)   |             | 1<br>(1.9)  |            | 54<br>(100.0)    | 22    | 76    | 41.60 | 24.17 |
| 不明<br>（％）                | 1<br>(0.2)   | 1<br>(0.2)  | 23<br>(4.6)  | 93<br>(18.6)  | 153<br>(30.6)   | 141<br>(28.2)   | 54<br>(10.8)  | 24<br>(4.8)  | 7<br>(1.4)   | 2<br>(0.4)  |             | 1<br>(0.2) | 500<br>(100.0)   | 340   | 840   | 59.44 | 13.61 |
| 再導入<br>（％）               | 1<br>(3.2)   |             |              | 10<br>(32.3)  | 9<br>(29.0)     | 7<br>(22.6)     | 2<br>(6.5)    | 1<br>(3.2)   |              |             |             | 1<br>(3.2) | 31<br>(100.0)    | 20    | 51    | 57.55 | 17.07 |
| その他<br>（％）               | 9<br>(5.8)   | 3<br>(1.9)  | 13<br>(8.3)  | 26<br>(16.7)  | 38<br>(24.4)    | 37<br>(23.7)    | 20<br>(12.8)  | 9<br>(5.8)   | 1<br>(0.6)   |             |             |            | 156<br>(100.0)   | 93    | 249   | 55.70 | 17.83 |
| 合計<br>（％）                | 38<br>(0.7)  | 23<br>(0.4) | 172<br>(3.1) | 904<br>(16.2) | 1,591<br>(28.4) | 1,616<br>(28.9) | 811<br>(14.5) | 298<br>(5.3) | 104<br>(1.9) | 20<br>(0.4) | 10<br>(0.2) | 9<br>(0.2) | 5,596<br>(100.0) | 3,345 | 8,941 | 60.74 | 13.90 |
| 記載なし<br>（％）              |              |             |              |               |                 |                 |               |              |              |             |             |            |                  |       |       |       |       |
| 総計<br>（％）                | 38<br>(0.7)  | 23<br>(0.4) | 172<br>(3.1) | 904<br>(16.2) | 1,591<br>(28.4) | 1,616<br>(28.9) | 811<br>(14.5) | 298<br>(5.3) | 104<br>(1.9) | 20<br>(0.4) | 10<br>(0.2) | 9<br>(0.2) | 5,596<br>(100.0) | 3,345 | 8,941 | 60.74 | 13.90 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査