

表 2562 体重(kg) 糖尿病の既往別（腹膜透析患者）

糖尿病の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	38	22	129	610	904	823	361	128	24	6	2	3	3,050	623	3,673	58.15	13.77
(%)	(100.0)	(100.0)	(80.1)	(72.8)	(61.6)	(54.4)	(47.1)	(46.0)	(23.8)	(30.0)	(22.2)	(33.3)	(58.4)	(36.6)	(53.0)		
既往あり			32	228	563	689	406	150	77	14	7	6	2,172	1,080	3,252	64.55	13.51
(%)			(19.9)	(27.2)	(38.4)	(45.6)	(52.9)	(54.0)	(76.2)	(70.0)	(77.8)	(66.7)	(41.6)	(63.4)	(47.0)		
合計	38	22	161	838	1,467	1,512	767	278	101	20	9	9	5,222	1,703	6,925	60.81	14.02
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			2	5	5	4	2	4					22	4	26	60.49	15.27
記載なし		1	9	61	119	100	42	16	3		1		352	1,638	1,990	59.71	11.82
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査