

表 2563 体重(kg) 心筋梗塞の既往別（腹膜透析患者）

心筋梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	38	22	149	752	1,289	1,308	654	239	74	16	8	9	4,558	802	5,360	60.43	14.07
(%)	(100.0)	(100.0)	(94.9)	(93.2)	(91.4)	(91.0)	(92.1)	(91.2)	(85.1)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(91.8)	(87.8)	(91.2)		
既往あり			8	55	121	130	56	23	13				406	111	517	62.05	12.59
(%)			(5.1)	(6.8)	(8.6)	(9.0)	(7.9)	(8.8)	(14.9)				(8.2)	(12.2)	(8.8)		
合計	38	22	157	807	1,410	1,438	710	262	87	16	8	9	4,964	913	5,877	60.57	13.96
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	9	11	9	8	7	1	1			47	19	66	64.68	15.20
記載なし		1	14	88	170	169	93	29	16	3	2		585	2,413	2,998	61.94	13.13
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査