

表 2564 体重(kg) 脳出血の既往別（腹膜透析患者）

脳出血の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	36	22	149	774	1,349	1,393	689	257	86	16	7	9	4,787	846	5,633	60.64	13.98
(%)	(94.7)	(95.7)	(94.9)	(95.3)	(95.7)	(97.0)	(96.5)	(97.3)	(98.9)	(94.1)	(87.5)	(100.0)	(96.2)	(93.9)	(95.9)		
既往あり	2	1	8	38	60	43	25	7	1	1	1		187	55	242	58.63	14.32
(%)	(5.3)	(4.3)	(5.1)	(4.7)	(4.3)	(3.0)	(3.5)	(2.7)	(1.1)	(5.9)	(12.5)		(3.8)	(6.1)	(4.1)		
合計	38	23	157	812	1,409	1,436	714	264	87	17	8	9	4,974	901	5,875	60.56	13.99
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	4	7	5	2	4	1				24	11	35	63.63	14.57
記載なし			14	88	175	175	95	30	16	3	2		598	2,433	3,031	62.12	12.97
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査