

表 2565 体重(kg) 脳梗塞の既往別（腹膜透析患者）

脳梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	37	23	142	718	1,248	1,287	640	249	81	15	8	7	4,455	769	5,224	60.65	14.13
(%)	(97.4)	(100.0)	(89.9)	(87.2)	(87.8)	(89.2)	(88.6)	(94.3)	(92.0)	(88.2)	(100.0)	(77.8)	(88.9)	(81.5)	(87.7)		
既往あり	1		16	105	173	156	82	15	7	2		2	559	175	734	59.76	12.69
(%)	(2.6)		(10.1)	(12.8)	(12.2)	(10.8)	(11.4)	(5.7)	(8.0)	(11.8)		(22.2)	(11.1)	(18.5)	(12.3)		
合計	38	23	158	823	1,421	1,443	722	264	88	17	8	9	5,014	944	5,958	60.55	13.97
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	3	8	6	2	4	1				25	12	37	64.08	14.33
記載なし			13	78	162	167	87	30	15	3	2		557	2,389	2,946	62.31	13.06
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査