

表 2567 体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)	38 (100.0)	23 (100.0)	140 (90.3)	785 (96.6)	1,388 (98.6)	1,411 (98.5)	706 (98.6)	263 (99.6)	88 (100.0)	17 (100.0)	8 (100.0)	9 (100.0)	4,876 (98.1)	855 (95.7)	5,731 (97.7)	60.73	13.99
既往あり (%)			15 (9.7)	28 (3.4)	20 (1.4)	22 (1.5)	10 (1.4)	1 (0.4)					96 (1.9)	38 (4.3)	134 (2.3)	53.48	12.26
合計 (%)	38 (100.0)	23 (100.0)	155 (100.0)	813 (100.0)	1,408 (100.0)	1,433 (100.0)	716 (100.0)	264 (100.0)	88 (100.0)	17 (100.0)	8 (100.0)	9 (100.0)	4,972 (100.0)	893 (100.0)	5,865 (100.0)	60.59	14.00
不明			2	6	17	11	4	4					44	11	55	60.13	11.85
記載なし			15	85	166	172	91	30	16	3	2		580	2,441	3,021	62.12	13.11
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査