

表 2568 体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者 男性のみ）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)	18 (100.0)	9 (100.0)	15 (88.2)	171 (97.7)	787 (98.4)	1,157 (98.4)	625 (98.4)	243 (99.6)	78 (100.0)	16 (100.0)	8 (100.0)	6 (100.0)	3,133 (98.5)	542 (96.8)	3,675 (98.2)	65.39	12.69
既往あり (%)			2 (11.8)	4 (2.3)	13 (1.6)	19 (1.6)	10 (1.6)	1 (0.4)					49 (1.5)	18 (3.2)	67 (1.8)	61.63	10.10
合計 (%)	18 (100.0)	9 (100.0)	17 (100.0)	175 (100.0)	800 (100.0)	1,176 (100.0)	635 (100.0)	244 (100.0)	78 (100.0)	16 (100.0)	8 (100.0)	6 (100.0)	3,182 (100.0)	560 (100.0)	3,742 (100.0)	65.33	12.66
不明				1	10	11	3	3					28	6	34	64.65	9.39
記載なし			1	28	91	142	78	26	16	3	2		387	1,579	1,966	66.19	12.35
総計	18	9	18	204	901	1,329	716	273	94	19	10	6	3,597	2,145	5,742	65.42	12.61

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査