

表 2569 体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者 女性のみ）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)	20 (100.0)	14 (100.0)	125 (90.6)	614 (96.2)	601 (98.8)	254 (98.8)	81 (100.0)	20 (100.0)	10 (100.0)	1 (100.0)		3 (100.0)	1,743 (97.4)	313 (94.0)	2,056 (96.8)	52.35	12.20
既往あり (%)			13 (9.4)	24 (3.8)	7 (1.2)	3 (1.2)							47 (2.6)	20 (6.0)	67 (3.2)	44.98	7.71
合計 (%)	20 (100.0)	14 (100.0)	138 (100.0)	638 (100.0)	608 (100.0)	257 (100.0)	81 (100.0)	20 (100.0)	10 (100.0)	1 (100.0)		3 (100.0)	1,790 (100.0)	333 (100.0)	2,123 (100.0)	52.15	12.16
不明			2	5	7		1	1					16	5	21	52.23	11.79
記載なし			14	57	75	30	13	4					193	862	1,055	53.95	10.51
総計	20	14	154	700	690	287	95	25	10	1		3	1,999	1,200	3,199	52.33	12.01

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査