

表 2570 体重(kg) 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

降圧薬使用の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	18	7	74	207	311	250	99	35	14	2	3	3	1,023	264	1,287	56.85	15.21
(%)	(47.4)	(30.4)	(46.3)	(24.4)	(21.0)	(16.6)	(13.3)	(12.8)	(15.1)	(11.1)	(37.5)	(33.3)	(19.6)	(27.2)	(20.8)		
あり	20	16	86	642	1,173	1,260	643	239	79	16	5	6	4,185	707	4,892	61.51	13.41
(%)	(52.6)	(69.6)	(53.8)	(75.6)	(79.0)	(83.4)	(86.7)	(87.2)	(84.9)	(88.9)	(62.5)	(66.7)	(80.4)	(72.8)	(79.2)		
合計	38	23	160	849	1,484	1,510	742	274	93	18	8	9	5,208	971	6,179	60.59	13.90
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	6	12	11	7	4	1				42	29	71	63.36	13.03
記載なし			11	49	95	95	62	20	10	2	2		346	2,345	2,691	62.69	13.76
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査