

表 2575 体重(kg) 身長(cm)別（腹膜透析患者 女性のみ）

身長	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)	20 (64.5)	8 (25.8)	1 (3.2)	2 (6.5)									31 (100.0)	2	33	17.66	11.38
130～ (%)		1 (12.5)	4 (50.0)	3 (37.5)									8 (100.0)	1	9	38.24	8.39
135～ (%)			22 (47.8)	16 (34.8)	8 (17.4)								46 (100.0)	11	57	41.64	7.42
140～ (%)		2 (1.2)	35 (20.5)	78 (45.6)	44 (25.7)	10 (5.8)	1 (0.6)					1 (0.6)	171 (100.0)	48	219	47.17	10.97
145～ (%)		1 (0.3)	34 (9.9)	180 (52.5)	93 (27.1)	31 (9.0)	3 (0.9)	1 (0.3)					343 (100.0)	87	430	48.86	7.84
150～ (%)		1 (0.2)	35 (6.4)	206 (37.4)	204 (37.0)	79 (14.3)	21 (3.8)	2 (0.4)	3 (0.5)				551 (100.0)	143	694	52.27	9.44
155～ (%)		1 (0.2)	13 (2.7)	144 (30.1)	193 (40.4)	90 (18.8)	27 (5.6)	8 (1.7)	2 (0.4)				478 (100.0)	100	578	54.87	10.02
160～ (%)			3 (1.3)	42 (18.3)	101 (43.9)	48 (20.9)	26 (11.3)	6 (2.6)	3 (1.3)			1 (0.4)	230 (100.0)	49	279	58.92	12.60
165～ (%)				6 (12.0)	14 (28.0)	18 (36.0)	8 (16.0)	3 (6.0)		1 (2.0)			50 (100.0)	12	62	63.16	12.06
170～ (%)				2 (16.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	2 (16.7)	3 (25.0)					12 (100.0)	4	16	67.78	13.94
175～ (%)							1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)				4 (100.0)		4	84.93	7.43
180～ (%)														1	1		
185～ (%)																	
190～ (%)																	
合計 (%)	20 (1.0)	14 (0.7)	147 (7.6)	679 (35.3)	659 (34.3)	279 (14.5)	89 (4.6)	25 (1.3)	9 (0.5)	1 (0.1)		2 (0.1)	1,924 (100.0)	458	2,382	52.23	11.85
記載なし (%)			7 (9.3)	21 (28.0)	31 (41.3)	8 (10.7)	6 (8.0)		1 (1.3)			1 (1.3)	75 (100.0)	742	817	54.89	15.57
総計 (%)	20 (1.0)	14 (0.7)	154 (7.7)	700 (35.0)	690 (34.5)	287 (14.4)	95 (4.8)	25 (1.3)	10 (0.5)	1 (0.1)		3 (0.2)	1,999 (100.0)	1,200	3,199	52.33	12.01
平均	86.25	130.21	145.88	150.74	153.62	155.54	158.21	161.88	159.00	165.00		151.50	151.77	151.93	151.80		
標準偏差	21.02	16.59	6.97	6.52	6.05	5.98	5.85	7.42	8.40			12.02	10.15	9.09	9.96		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査