

表 2581 体重(kg) アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)			3 (27.3)	3 (27.3)	2 (18.2)	1 (9.1)	1 (9.1)		1 (9.1)				11 (100.0)	4	15	52.49	19.30
1.5～ (%)	1 (1.7)	1 (1.7)	6 (10.0)	20 (33.3)	18 (30.0)	9 (15.0)	3 (5.0)		2 (3.3)				60 (100.0)	11	71	52.11	13.47
2.0～ (%)	1 (0.4)	2 (0.8)	27 (10.5)	62 (24.1)	93 (36.2)	45 (17.5)	17 (6.6)	7 (2.7)	2 (0.8)			1 (0.4)	257 (100.0)	41	298	54.69	12.92
2.5～ (%)	9 (1.0)	7 (0.7)	45 (4.8)	183 (19.4)	323 (34.3)	230 (24.4)	102 (10.8)	31 (3.3)	11 (1.2)	1 (0.1)			942 (100.0)	95	1,037	57.44	12.93
3.0～ (%)	12 (0.6)	7 (0.4)	45 (2.3)	304 (15.4)	559 (28.4)	618 (31.4)	290 (14.7)	89 (4.5)	31 (1.6)	6 (0.3)	5 (0.3)	4 (0.2)	1,970 (100.0)	188	2,158	60.95	13.43
3.5～ (%)	7 (0.4)	3 (0.2)	35 (2.0)	248 (14.3)	449 (25.8)	541 (31.1)	286 (16.5)	113 (6.5)	39 (2.2)	9 (0.5)	4 (0.2)	3 (0.2)	1,737 (100.0)	169	1,906	62.61	13.67
4.0～ (%)	5 (1.3)	1 (0.3)	6 (1.6)	48 (12.6)	83 (21.7)	103 (27.0)	76 (19.9)	42 (11.0)	14 (3.7)	3 (0.8)		1 (0.3)	382 (100.0)	49	431	64.74	16.08
4.5～ (%)	1 (5.3)			1 (5.3)	5 (26.3)	5 (26.3)	5 (26.3)	2 (10.5)					19 (100.0)	2	21	63.31	17.14
5.0～ (%)				1 (50.0)	1 (50.0)								2 (100.0)		2	46.95	6.86
合計 (%)	36 (0.7)	21 (0.4)	167 (3.1)	870 (16.2)	1,533 (28.5)	1,552 (28.8)	780 (14.5)	284 (5.3)	100 (1.9)	19 (0.4)	9 (0.2)	9 (0.2)	5,380 (100.0)	559	5,939	60.73	13.88
記載なし (%)	2 (0.9)	2 (0.9)	5 (2.3)	34 (15.7)	58 (26.9)	64 (29.6)	31 (14.4)	14 (6.5)	4 (1.9)	1 (0.5)	1 (0.5)		216 (100.0)	2,786	3,002	61.14	14.41
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	3.29	3.03	2.96	3.18	3.22	3.33	3.39	3.48	3.39	3.64	3.48	3.38	3.28	3.23	3.28		
標準偏差	0.57	0.62	0.63	0.55	0.51	0.46	0.47	0.46	0.54	0.37	0.27	0.58	0.51	0.59	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査