

表 2582 体重(kg) CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	28 (1.0)	10 (0.4)	81 (2.9)	523 (18.5)	830 (29.3)	806 (28.5)	382 (13.5)	130 (4.6)	31 (1.1)	4 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.2)	2,833 (100.0)	234	3,067	59.51	13.55
0.2～ (%)	2 (0.2)	4 (0.4)	26 (2.9)	115 (12.6)	235 (25.8)	269 (29.6)	162 (17.8)	59 (6.5)	30 (3.3)	3 (0.3)	3 (0.3)	2 (0.2)	910 (100.0)	85	995	63.03	14.12
0.5～ (%)	3 (0.7)	4 (1.0)	15 (3.7)	51 (12.7)	105 (26.2)	118 (29.4)	64 (16.0)	29 (7.2)	10 (2.5)	2 (0.5)			401 (100.0)	48	449	61.80	14.17
1.0～ (%)			7 (2.6)	36 (13.4)	81 (30.1)	84 (31.2)	38 (14.1)	17 (6.3)	4 (1.5)	2 (0.7)			269 (100.0)	39	308	61.73	12.56
2.0～ (%)	1 (0.6)	2 (1.1)	9 (5.0)	21 (11.7)	56 (31.1)	50 (27.8)	21 (11.7)	7 (3.9)	7 (3.9)	4 (2.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	180 (100.0)	22	202	62.17	17.11
4.0～ (%)			1 (1.4)	10 (13.7)	24 (32.9)	21 (28.8)	6 (8.2)	4 (5.5)	5 (6.8)		1 (1.4)	1 (1.4)	73 (100.0)	10	83	63.72	16.73
6.0～ (%)			3 (9.4)	6 (18.8)	11 (34.4)	7 (21.9)	4 (12.5)			1 (3.1)			32 (100.0)	8	40	57.70	13.92
8.0～ (%)			1 (5.0)	6 (30.0)	7 (35.0)	3 (15.0)	1 (5.0)	2 (10.0)					20 (100.0)	4	24	57.35	13.02
10.0～ (%)			2 (6.7)	5 (16.7)	5 (16.7)	10 (33.3)	6 (20.0)	2 (6.7)					30 (100.0)	4	34	61.21	13.90
15.0～ (%)			1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)						5 (100.0)	2	7	54.48	12.82
合計 (%)	34 (0.7)	20 (0.4)	146 (3.1)	773 (16.3)	1,356 (28.5)	1,369 (28.8)	685 (14.4)	250 (5.3)	87 (1.8)	16 (0.3)	8 (0.2)	9 (0.2)	4,753 (100.0)	456	5,209	60.65	13.94
記載なし (%)	4 (0.5)	3 (0.4)	26 (3.1)	131 (15.5)	235 (27.9)	247 (29.3)	126 (14.9)	48 (5.7)	17 (2.0)	4 (0.5)	2 (0.2)		843 (100.0)	2,889	3,732	61.27	13.65
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	0.17	0.47	0.94	0.54	0.61	0.57	0.60	0.62	0.77	1.38	1.25	1.06	0.60	0.91	0.63		
標準偏差	0.37	0.75	2.46	1.51	1.61	1.48	2.04	1.55	1.24	1.64	1.96	1.89	1.65	2.26	1.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査