

表 2583 体重(kg) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)				2 (8.0)	7 (28.0)	10 (40.0)	3 (12.0)	3 (12.0)					25 (100.0)	4	29	64.27	11.39
7.0～ (%)			1 (3.4)	3 (10.3)	8 (27.6)	7 (24.1)	3 (10.3)	4 (13.8)	3 (10.3)				29 (100.0)	7	36	65.53	16.16
7.5～ (%)		1 (0.9)	4 (3.7)	18 (16.7)	19 (17.6)	29 (26.9)	23 (21.3)	9 (8.3)	5 (4.6)				108 (100.0)	19	127	63.16	14.71
8.0～ (%)		1 (0.4)	1 (0.4)	31 (12.9)	52 (21.7)	71 (29.6)	52 (21.7)	20 (8.3)	7 (2.9)	3 (1.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	240 (100.0)	46	286	65.48	14.24
8.4～ (%)				11 (14.1)	13 (16.7)	23 (29.5)	20 (25.6)	8 (10.3)	2 (2.6)		1 (1.3)		78 (100.0)	8	86	66.63	13.09
8.5～ (%)	1 (0.1)		13 (1.6)	117 (14.1)	217 (26.2)	260 (31.4)	129 (15.6)	69 (8.3)	15 (1.8)	4 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.2)	828 (100.0)	78	906	63.23	13.39
9.0～ (%)	4 (0.3)	3 (0.2)	44 (3.0)	223 (15.4)	416 (28.8)	445 (30.8)	209 (14.5)	69 (4.8)	25 (1.7)	2 (0.1)	4 (0.3)		1,444 (100.0)	158	1,602	60.82	12.87
9.5～ (%)	5 (0.3)	8 (0.5)	46 (3.1)	224 (15.0)	444 (29.7)	433 (28.9)	228 (15.2)	71 (4.7)	26 (1.7)	6 (0.4)	2 (0.1)	4 (0.3)	1,497 (100.0)	132	1,629	60.95	13.61
10.0～ (%)	3 (1.7)	2 (1.2)	8 (4.7)	32 (18.6)	56 (32.6)	45 (26.2)	18 (10.5)	3 (1.7)	4 (2.3)			1 (0.6)	172 (100.0)	19	191	57.36	14.54
10.1～ (%)	3 (0.6)	2 (0.4)	21 (4.2)	119 (23.7)	145 (28.8)	134 (26.6)	55 (10.9)	14 (2.8)	7 (1.4)	2 (0.4)		1 (0.2)	503 (100.0)	54	557	57.96	13.83
10.5～ (%)	11 (3.9)	1 (0.4)	13 (4.7)	61 (21.9)	89 (31.9)	67 (24.0)	24 (8.6)	8 (2.9)	4 (1.4)	1 (0.4)			279 (100.0)	17	296	55.72	14.94
11.0～ (%)	3 (2.9)	3 (2.9)	10 (9.6)	18 (17.3)	38 (36.5)	16 (15.4)	11 (10.6)	4 (3.8)	1 (1.0)				104 (100.0)	7	111	53.68	15.38
11.5～ (%)	1 (3.7)		2 (7.4)	8 (29.6)	8 (29.6)	6 (22.2)	1 (3.7)		1 (3.7)				27 (100.0)	2	29	53.60	14.07
12.0～ (%)	5 (20.0)		4 (16.0)		12 (48.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	1 (4.0)					25 (100.0)	2	27	46.53	20.04
合計 (%)	36 (0.7)	21 (0.4)	167 (3.1)	867 (16.2)	1,524 (28.4)	1,547 (28.9)	778 (14.5)	283 (5.3)	100 (1.9)	18 (0.3)	9 (0.2)	9 (0.2)	5,359 (100.0)	553	5,912	60.72	13.88
記載なし (%)	2 (0.8)	2 (0.8)	5 (2.1)	37 (15.6)	67 (28.3)	69 (29.1)	33 (13.9)	15 (6.3)	4 (1.7)	2 (0.8)	1 (0.4)		237 (100.0)	2,792	3,029	61.21	14.27
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	10.50	9.78	9.76	9.52	9.50	9.35	9.29	9.15	9.24	9.29	9.12	9.43	9.42	9.29	9.41		
標準偏差	0.95	0.88	0.87	0.77	0.79	0.75	0.75	0.82	0.84	0.77	0.53	0.76	0.79	0.84	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査