

表 2585 体重(kg) PTH値(pg/mL)別 (腹膜透析患者) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	2 (1.8)	1 (0.9)	4 (3.5)	18 (15.9)	32 (28.3)	32 (28.3)	15 (13.3)	5 (4.4)	3 (2.7)		1 (0.9)		113 (100.0)	10	123	59.68	15.39
20～ (%)	4 (1.6)	3 (1.2)	8 (3.1)	47 (18.2)	76 (29.5)	68 (26.4)	35 (13.6)	9 (3.5)	7 (2.7)	1 (0.4)			258 (100.0)	23	281	59.01	14.49
40～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	8 (3.3)	32 (13.2)	73 (30.2)	74 (30.6)	32 (13.2)	13 (5.4)	6 (2.5)	1 (0.4)	1 (0.4)		242 (100.0)	26	268	61.07	13.65
60～ (%)	3 (1.0)		8 (2.8)	54 (18.7)	88 (30.4)	86 (29.8)	35 (12.1)	9 (3.1)	6 (2.1)				289 (100.0)	26	315	59.19	12.84
80～ (%)	3 (1.1)	2 (0.7)	6 (2.1)	48 (17.0)	77 (27.3)	84 (29.8)	43 (15.2)	12 (4.3)	7 (2.5)				282 (100.0)	27	309	60.43	13.40
100～ (%)	2 (0.7)	1 (0.4)	7 (2.5)	57 (20.0)	100 (35.1)	67 (23.5)	33 (11.6)	12 (4.2)	2 (0.7)	3 (1.1)	1 (0.4)		285 (100.0)	31	316	58.82	13.43
120～ (%)		2 (0.7)	10 (3.7)	29 (10.7)	90 (33.1)	80 (29.4)	37 (13.6)	17 (6.3)	3 (1.1)	3 (1.1)		1 (0.4)	272 (100.0)	33	305	61.79	13.78
140～ (%)	1 (0.4)		4 (1.6)	39 (15.2)	80 (31.1)	76 (29.6)	36 (14.0)	16 (6.2)	4 (1.6)	1 (0.4)			257 (100.0)	28	285	61.11	12.45
160～ (%)	2 (0.8)	1 (0.4)	8 (3.2)	39 (15.7)	68 (27.3)	75 (30.1)	32 (12.9)	16 (6.4)	3 (1.2)	3 (1.2)	1 (0.4)	1 (0.4)	249 (100.0)	27	276	61.42	15.84
180～ (%)	3 (0.5)	1 (0.2)	15 (2.5)	85 (14.3)	166 (27.9)	193 (32.4)	86 (14.4)	36 (6.0)	8 (1.3)			3 (0.5)	596 (100.0)	58	654	61.59	13.60
240～ (%)				1 (11.1)	4 (44.4)	3 (33.3)					1 (11.1)		9 (100.0)	1	10	65.63	18.59
241～ (%)	3 (0.8)	1 (0.3)	10 (2.5)	64 (16.2)	110 (27.9)	108 (27.4)	71 (18.0)	16 (4.1)	10 (2.5)		1 (0.3)		394 (100.0)	37	431	61.19	13.34
300～ (%)		1 (0.3)	9 (2.9)	43 (14.1)	88 (28.8)	94 (30.7)	37 (12.1)	27 (8.8)	6 (2.0)			1 (0.3)	306 (100.0)	25	331	61.96	14.03
360～ (%)	3 (1.7)	1 (0.6)	3 (1.7)	37 (20.4)	47 (26.0)	46 (25.4)	29 (16.0)	8 (4.4)	5 (2.8)	2 (1.1)			181 (100.0)	19	200	60.46	15.21
420～ (%)	1 (0.8)	1 (0.8)	6 (4.9)	26 (21.1)	32 (26.0)	28 (22.8)	23 (18.7)	4 (3.3)		1 (0.8)		1 (0.8)	123 (100.0)	16	139	58.70	14.71
480～ (%)			2 (5.3)	8 (21.1)	5 (13.2)	11 (28.9)	5 (13.2)	5 (13.2)	2 (5.3)				38 (100.0)	5	43	63.75	15.99
500～ (%)			3 (6.4)	5 (10.6)	8 (17.0)	14 (29.8)	7 (14.9)	7 (14.9)	2 (4.3)	1 (2.1)			47 (100.0)	7	54	65.33	16.60
540～ (%)				10 (15.9)	19 (30.2)	20 (31.7)	8 (12.7)	4 (6.3)	1 (1.6)		1 (1.6)		63 (100.0)	10	73	62.29	13.24
600～ (%)	1 (1.1)	3 (3.2)	4 (4.3)	22 (23.4)	24 (25.5)	21 (22.3)	11 (11.7)	6 (6.4)	2 (2.1)				94 (100.0)	11	105	57.51	14.90
800～ (%)	5 (5.0)	1 (1.0)	6 (6.0)	19 (19.0)	27 (27.0)	23 (23.0)	12 (12.0)	6 (6.0)			1 (1.0)		100 (100.0)	10	110	55.81	17.28
合計 (%)	34 (0.8)	20 (0.5)	121 (2.9)	683 (16.3)	1,214 (28.9)	1,203 (28.7)	587 (14.0)	228 (5.4)	77 (1.8)	16 (0.4)	8 (0.2)	7 (0.2)	4,198 (100.0)	430	4,628	60.60	14.08
記載なし (%)		1 (0.4)	10 (4.3)	37 (15.7)	68 (28.9)	63 (26.8)	41 (17.4)	10 (4.3)	3 (1.3)	1 (0.4)		1 (0.4)	235 (100.0)	141	376	60.93	13.51
総計 (%)	34 (0.8)	21 (0.5)	131 (3.0)	720 (16.2)	1,282 (28.9)	1,266 (28.6)	628 (14.2)	238 (5.4)	80 (1.8)	17 (0.4)	8 (0.2)	8 (0.2)	4,433 (100.0)	571	5,004	60.62	14.05
平均	337.09	287.10	246.66	235.40	217.77	212.52	221.62	249.07	202.34	200.56	367.13	245.14	223.48	227.72	223.88		
標準偏差	445.70	289.39	242.00	246.48	262.28	190.37	192.72	246.70	162.87	145.59	485.99	117.72	231.28	209.33	229.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査