

表 2591 体重(kg) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)			1 (100.0)										1 (100.0)		1	31.40	
60～ (%)	1 (7.7)		3 (23.1)	5 (38.5)	1 (7.7)	2 (15.4)	1 (7.7)						13 (100.0)		13	46.89	16.75
80～ (%)	10 (8.3)	3 (2.5)	12 (9.9)	31 (25.6)	32 (26.4)	21 (17.4)	11 (9.1)		1 (0.8)				121 (100.0)	3	124	49.87	17.18
100～ (%)	22 (3.5)	10 (1.6)	33 (5.3)	124 (19.8)	190 (30.4)	160 (25.6)	60 (9.6)	20 (3.2)	6 (1.0)	1 (0.2)			626 (100.0)	15	641	55.68	14.87
120～ (%)	3 (0.2)	5 (0.3)	53 (3.6)	270 (18.2)	423 (28.5)	461 (31.1)	185 (12.5)	65 (4.4)	13 (0.9)	4 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,484 (100.0)	32	1,516	59.64	12.46
140～ (%)		3 (0.2)	28 (1.8)	197 (12.8)	470 (30.6)	445 (28.9)	245 (15.9)	100 (6.5)	35 (2.3)	6 (0.4)	5 (0.3)	4 (0.3)	1,538 (100.0)	41	1,579	62.77	13.45
160～ (%)			9 (1.3)	82 (11.7)	174 (24.9)	222 (31.8)	133 (19.0)	49 (7.0)	27 (3.9)	2 (0.3)	1 (0.1)		699 (100.0)	22	721	64.21	12.92
180～ (%)			3 (1.4)	28 (13.1)	46 (21.5)	68 (31.8)	38 (17.8)	16 (7.5)	11 (5.1)	2 (0.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	214 (100.0)	3	217	65.36	14.83
200～ (%)				3 (10.3)	9 (31.0)	7 (24.1)	5 (17.2)	3 (10.3)	1 (3.4)	1 (3.4)			29 (100.0)	2	31	65.96	14.61
220～ (%)					2 (20.0)	6 (60.0)	2 (20.0)						10 (100.0)		10	64.05	7.00
合計 (%)	36 (0.8)	21 (0.4)	142 (3.0)	740 (15.6)	1,347 (28.4)	1,392 (29.4)	680 (14.4)	253 (5.3)	94 (2.0)	16 (0.3)	8 (0.2)	6 (0.1)	4,735 (100.0)	118	4,853	60.82	13.87
記載なし (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	30 (3.5)	164 (19.0)	244 (28.3)	224 (26.0)	131 (15.2)	45 (5.2)	10 (1.2)	4 (0.5)	2 (0.2)	3 (0.3)	861 (100.0)	3,227	4,088	60.32	14.04
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	102.78	116.48	127.07	135.62	140.19	142.62	145.98	147.76	152.56	154.75	154.50	153.00	140.98	142.29	141.01		
標準偏差	12.29	15.77	24.00	22.83	21.90	22.24	22.26	21.40	21.26	24.42	19.16	23.34	22.90	21.94	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査