

表 2592 体重(kg) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)							1 (100.0)		1	61.40	
20～ (%)	1 (6.7)		3 (20.0)	2 (13.3)	7 (46.7)	2 (13.3)							15 (100.0)		15	48.37	14.80
40～ (%)	10 (2.8)	3 (0.8)	27 (7.5)	76 (21.0)	100 (27.6)	92 (25.4)	37 (10.2)	10 (2.8)	6 (1.7)	1 (0.3)			362 (100.0)	13	375	55.93	14.88
60～ (%)	15 (0.7)	10 (0.5)	62 (3.1)	359 (17.7)	627 (30.9)	585 (28.9)	257 (12.7)	74 (3.7)	27 (1.3)	4 (0.2)	4 (0.2)	2 (0.1)	2,026 (100.0)	39	2,065	59.37	13.24
80～ (%)	3 (0.2)	5 (0.4)	31 (2.5)	172 (13.7)	341 (27.2)	401 (32.0)	193 (15.4)	70 (5.6)	29 (2.3)	4 (0.3)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,253 (100.0)	43	1,296	62.08	13.40
90～ (%)		1 (0.1)	15 (2.2)	87 (12.5)	185 (26.5)	201 (28.8)	125 (17.9)	56 (8.0)	20 (2.9)	5 (0.7)	2 (0.3)		697 (100.0)	17	714	63.68	13.44
100～ (%)		2 (0.6)	4 (1.2)	42 (12.3)	79 (23.1)	101 (29.5)	61 (17.8)	39 (11.4)	11 (3.2)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	342 (100.0)	5	347	65.03	14.13
120～ (%)				1 (5.9)	3 (17.6)	3 (17.6)	5 (29.4)	2 (11.8)	1 (5.9)	1 (5.9)		1 (5.9)	17 (100.0)	1	18	77.74	27.17
140～ (%)						1 (100.0)							1 (100.0)		1	65.60	
合計 (%)	29 (0.6)	21 (0.4)	142 (3.0)	739 (15.7)	1,342 (28.5)	1,387 (29.4)	678 (14.4)	251 (5.3)	94 (2.0)	16 (0.3)	8 (0.2)	7 (0.1)	4,714 (100.0)	118	4,832	60.91	13.83
記載なし (%)	9 (1.0)	2 (0.2)	30 (3.4)	165 (18.7)	249 (28.2)	229 (26.0)	133 (15.1)	47 (5.3)	10 (1.1)	4 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	882 (100.0)	3,227	4,109	59.86	14.20
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	61.83	73.76	72.24	76.60	77.91	79.47	81.70	85.40	84.10	87.50	84.38	89.29	79.00	79.42	79.01		
標準偏差	14.12	17.10	15.40	14.09	13.98	13.88	14.45	14.64	14.56	17.77	13.20	19.92	14.46	13.46	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査