

表 2594 体重減少量(kg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	457	4,500	20,245	44,034	29,667	8,319	1,809	376	83	116	109,606	2,909	112,515	2.67	1.09
(%)	(0.4)	(4.1)	(18.5)	(40.2)	(27.1)	(7.6)	(1.7)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	298	3,950	20,780	29,127	8,443	1,126	149	19	12	44	63,948	1,746	65,694	2.17	0.89
(%)	(0.5)	(6.2)	(32.5)	(45.5)	(13.2)	(1.8)	(0.2)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
合計	755	8,450	41,025	73,161	38,110	9,445	1,958	395	95	160	173,554	4,655	178,209	2.49	1.05
(%)	(0.4)	(4.9)	(23.6)	(42.2)	(22.0)	(5.4)	(1.1)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	755	8,450	41,025	73,161	38,110	9,445	1,958	395	95	160	173,554	4,655	178,209	2.49	1.05
(%)	(0.4)	(4.9)	(23.6)	(42.2)	(22.0)	(5.4)	(1.1)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査