

表 2595 体重減少量(kg) 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

年齢	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (16.7)	2 (33.3)	2 (33.3)	1 (16.7)						6 (100.0)		6	2.12	0.94
15歳～ (%)	3 (0.7)	22 (5.2)	78 (18.4)	142 (33.4)	108 (25.4)	50 (11.8)	20 (4.7)	2 (0.5)			425 (100.0)	16	441	2.76	1.21
30歳～ (%)	28 (0.4)	205 (2.8)	854 (11.7)	2,175 (29.9)	2,274 (31.2)	1,181 (16.2)	420 (5.8)	106 (1.5)	25 (0.3)	14 (0.2)	7,282 (100.0)	198	7,480	3.16	1.30
45歳～ (%)	131 (0.4)	937 (3.1)	4,269 (13.9)	10,617 (34.6)	9,569 (31.2)	3,913 (12.8)	939 (3.1)	209 (0.7)	36 (0.1)	36 (0.1)	30,656 (100.0)	782	31,438	2.94	1.16
60歳～ (%)	325 (0.4)	3,556 (4.4)	18,045 (22.2)	35,835 (44.0)	19,385 (23.8)	3,651 (4.5)	489 (0.6)	63 (0.1)	24 (0.0)	65 (0.1)	81,438 (100.0)	2,145	83,583	2.49	0.98
75歳～ (%)	250 (0.5)	3,371 (6.6)	16,458 (32.4)	23,302 (45.9)	6,619 (13.0)	632 (1.2)	89 (0.2)	13 (0.0)	10 (0.0)	39 (0.1)	50,783 (100.0)	1,429	52,212	2.15	0.88
90歳～ (%)	18 (0.6)	358 (12.1)	1,317 (44.5)	1,088 (36.8)	152 (5.1)	18 (0.6)	1 (0.0)	2 (0.1)		6 (0.2)	2,960 (100.0)	85	3,045	1.84	0.99
合計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,023 (23.6)	73,161 (42.2)	38,108 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,550 (100.0)	4,655	178,205	2.49	1.05
不明 (%)			2 (50.0)		2 (50.0)						4 (100.0)		4	2.42	0.73
記載なし (%)															
総計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
平均	68.49	71.74	71.73	69.03	63.93	57.80	53.48	50.86	54.83	65.63	67.84	68.14	67.85		
標準偏差	12.66	11.96	11.34	11.37	11.52	11.39	11.42	10.91	13.53	13.64	12.15	12.30	12.15		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査