

表 2596 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	314 (0.6)	3,473 (6.1)	13,866 (24.5)	23,154 (40.9)	11,863 (20.9)	3,099 (5.5)	683 (1.2)	134 (0.2)	28 (0.0)	53 (0.1)	56,667 (100.0)	1,622	58,289	2.44	1.09
5年～ (%)	224 (0.4)	2,562 (4.4)	12,626 (21.9)	24,007 (41.6)	13,593 (23.6)	3,632 (6.3)	764 (1.3)	158 (0.3)	42 (0.1)	62 (0.1)	57,670 (100.0)	1,557	59,227	2.56	1.07
10年～ (%)	117 (0.4)	1,159 (4.0)	6,406 (21.9)	12,679 (43.3)	6,801 (23.2)	1,655 (5.7)	336 (1.1)	66 (0.2)	17 (0.1)	27 (0.1)	29,263 (100.0)	769	30,032	2.54	1.03
15年～ (%)	46 (0.3)	537 (3.6)	3,665 (24.6)	6,588 (44.3)	3,262 (21.9)	630 (4.2)	109 (0.7)	28 (0.2)	3 (0.0)	10 (0.1)	14,878 (100.0)	371	15,249	2.46	0.96
20年～ (%)	28 (0.4)	334 (4.3)	2,079 (26.8)	3,466 (44.7)	1,516 (19.5)	278 (3.6)	43 (0.6)	7 (0.1)	4 (0.1)	7 (0.1)	7,762 (100.0)	169	7,931	2.39	0.96
25年～ (%)	13 (0.3)	193 (4.9)	1,170 (29.6)	1,807 (45.8)	654 (16.6)	97 (2.5)	12 (0.3)			1 (0.0)	3,947 (100.0)	97	4,044	2.27	0.90
30年～ (%)	9 (0.4)	114 (5.3)	726 (33.8)	939 (43.8)	306 (14.3)	41 (1.9)	9 (0.4)	1 (0.0)			2,145 (100.0)	38	2,183	2.18	0.84
35年～ (%)	2 (0.2)	64 (6.4)	391 (38.9)	439 (43.6)	97 (9.6)	10 (1.0)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		1,006 (100.0)	27	1,033	2.05	0.79
40年～ (%)	2 (0.9)	14 (6.5)	96 (44.4)	82 (38.0)	18 (8.3)	3 (1.4)	1 (0.5)				216 (100.0)	5	221	1.94	0.78
合計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
平均	7.81	8.11	9.25	9.04	8.53	7.81	7.37	7.30	7.51	7.59	8.84	8.39	8.83		
標準偏差	6.66	7.12	7.65	7.03	6.26	5.53	5.17	4.85	5.48	5.22	6.94	6.64	6.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査