

表 2599 体重減少量(kg) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		2 (33.3)								4 (66.7)	6 (100.0)	56	62	13.97	11.78
20～ (%)	8 (1.2)	144 (22.3)	358 (55.3)	126 (19.5)	6 (0.9)	1 (0.2)	1 (0.2)			3 (0.5)	647 (100.0)	9	656	1.47	0.96
30～ (%)	121 (0.8)	1,660 (10.8)	7,079 (46.1)	5,737 (37.3)	704 (4.6)	33 (0.2)	8 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	15 (0.1)	15,361 (100.0)	11	15,372	1.81	0.81
40～ (%)	227 (0.5)	3,096 (6.5)	15,530 (32.7)	22,292 (46.9)	5,736 (12.1)	496 (1.0)	72 (0.2)	9 (0.0)	11 (0.0)	48 (0.1)	47,517 (100.0)	16	47,533	2.14	0.90
50～ (%)	237 (0.4)	2,278 (4.1)	12,000 (21.4)	26,257 (46.8)	13,016 (23.2)	1,968 (3.5)	249 (0.4)	26 (0.0)	11 (0.0)	45 (0.1)	56,087 (100.0)	19	56,106	2.46	0.92
60～ (%)	120 (0.4)	949 (2.8)	4,717 (13.9)	13,749 (40.5)	11,146 (32.8)	2,803 (8.3)	384 (1.1)	57 (0.2)	13 (0.0)	17 (0.1)	33,955 (100.0)	11	33,966	2.79	0.98
70～ (%)	32 (0.2)	251 (1.9)	1,059 (8.1)	3,893 (29.9)	5,162 (39.6)	2,106 (16.2)	450 (3.5)	63 (0.5)	10 (0.1)	8 (0.1)	13,034 (100.0)	7	13,041	3.18	1.04
80～ (%)	5 (0.1)	58 (1.3)	220 (5.0)	865 (19.5)	1,653 (37.2)	1,211 (27.3)	344 (7.7)	74 (1.7)	6 (0.1)	6 (0.1)	4,442 (100.0)	9	4,451	3.60	1.11
90～ (%)	2 (0.1)	5 (0.3)	47 (2.9)	185 (11.5)	520 (32.3)	545 (33.8)	228 (14.1)	63 (3.9)	13 (0.8)	4 (0.2)	1,612 (100.0)	3	1,615	4.06	1.14
100～ (%)	3 (0.6)	4 (0.7)	8 (1.5)	39 (7.2)	120 (22.2)	178 (33.0)	127 (23.5)	47 (8.7)	9 (1.7)	5 (0.9)	540 (100.0)		540	4.49	1.34
110～ (%)			6 (2.8)	12 (5.6)	33 (15.3)	68 (31.6)	55 (25.6)	29 (13.5)	9 (4.2)	3 (1.4)	215 (100.0)		215	4.82	1.36
120～ (%)		3 (2.2)	1 (0.7)	6 (4.3)	14 (10.1)	36 (26.1)	40 (29.0)	25 (18.1)	11 (8.0)	2 (1.4)	138 (100.0)		138	5.13	1.49
合計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	141	173,695	2.49	1.05
記載なし (%)												4,514	4,514		
総計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
平均	51.32	48.86	49.34	53.67	60.76	69.64	77.34	86.67	83.84	55.96	55.19	36.98	55.17		
標準偏差	11.81	10.91	10.25	10.52	11.75	14.36	18.16	21.60	28.92	21.71	12.75	25.90	12.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査