

表 2600 体重減少量(kg) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		2 (66.7)								1 (33.3)	3 (100.0)	30	33	6.67	10.77
20～ (%)	1 (5.0)	6 (30.0)	6 (30.0)	5 (25.0)	1 (5.0)	1 (5.0)					20 (100.0)	7	27	1.64	1.15
30～ (%)	16 (0.8)	313 (14.7)	908 (42.6)	753 (35.3)	125 (5.9)	9 (0.4)	1 (0.0)	1 (0.0)		5 (0.2)	2,131 (100.0)	8	2,139	1.79	0.97
40～ (%)	125 (0.6)	1,417 (7.1)	6,071 (30.2)	9,249 (46.0)	2,867 (14.3)	284 (1.4)	37 (0.2)	4 (0.0)	6 (0.0)	35 (0.2)	20,095 (100.0)	10	20,105	2.19	1.01
50～ (%)	174 (0.4)	1,683 (4.1)	8,253 (20.2)	18,509 (45.3)	10,309 (25.2)	1,664 (4.1)	224 (0.5)	23 (0.1)	9 (0.0)	36 (0.1)	40,884 (100.0)	15	40,899	2.51	0.95
60～ (%)	104 (0.4)	805 (2.8)	3,852 (13.4)	11,297 (39.3)	9,717 (33.8)	2,547 (8.9)	360 (1.3)	56 (0.2)	12 (0.0)	13 (0.0)	28,763 (100.0)	9	28,772	2.82	0.99
70～ (%)	28 (0.2)	212 (1.8)	917 (8.0)	3,292 (28.7)	4,592 (40.0)	1,935 (16.9)	428 (3.7)	60 (0.5)	10 (0.1)	6 (0.1)	11,480 (100.0)	4	11,484	3.21	1.05
80～ (%)	5 (0.1)	52 (1.3)	188 (4.8)	721 (18.3)	1,460 (37.0)	1,111 (28.2)	323 (8.2)	72 (1.8)	6 (0.2)	6 (0.2)	3,944 (100.0)	6	3,950	3.64	1.12
90～ (%)	2 (0.1)	4 (0.3)	37 (2.5)	162 (11.1)	445 (30.6)	505 (34.8)	221 (15.2)	61 (4.2)	12 (0.8)	4 (0.3)	1,453 (100.0)	2	1,455	4.12	1.14
100～ (%)	2 (0.4)	4 (0.8)	6 (1.2)	32 (6.3)	111 (21.9)	167 (33.0)	125 (24.7)	46 (9.1)	8 (1.6)	5 (1.0)	506 (100.0)		506	4.54	1.32
110～ (%)			6 (3.0)	10 (5.1)	27 (13.6)	63 (31.8)	52 (26.3)	28 (14.1)	9 (4.5)	3 (1.5)	198 (100.0)		198	4.89	1.37
120～ (%)		2 (1.6)	1 (0.8)	4 (3.1)	13 (10.1)	33 (25.6)	38 (29.5)	25 (19.4)	11 (8.5)	2 (1.6)	129 (100.0)		129	5.23	1.44
合計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	116 (0.1)	109,606 (100.0)	91	109,697	2.67	1.09
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	116 (0.1)	109,606 (100.0)	2,909	112,515	2.67	1.09
平均	55.64	53.62	54.25	57.19	62.58	70.54	78.36	87.67	87.99	60.55	59.45	39.65	59.43		
標準偏差	10.63	10.20	9.52	9.67	11.07	13.98	17.62	21.01	27.60	21.96	12.02	25.37	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査