

表 2602 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	755 (20.4)	2,939 (79.5)	2 (0.1)								3,696 (100.0)		3,696	0.14	0.33
1.0～ (%)		4,383 (66.3)	2,219 (33.6)	7 (0.1)							6,609 (100.0)		6,609	0.86	0.25
2.0～ (%)		1,089 (6.4)	14,405 (85.1)	1,381 (8.2)	41 (0.2)	4 (0.0)	1 (0.0)				16,921 (100.0)		16,921	1.44	0.37
3.0～ (%)		37 (0.1)	16,439 (47.5)	16,564 (47.9)	1,435 (4.1)	102 (0.3)	6 (0.0)	1 (0.0)			34,584 (100.0)		34,584	2.03	0.50
4.0～ (%)		1 (0.0)	6,614 (14.2)	29,745 (64.1)	8,833 (19.0)	1,082 (2.3)	126 (0.3)	12 (0.0)	2 (0.0)		46,415 (100.0)		46,415	2.55	0.60
5.0～ (%)			1,201 (3.3)	18,022 (49.7)	14,112 (38.9)	2,528 (7.0)	354 (1.0)	64 (0.2)	7 (0.0)	1 (0.0)	36,289 (100.0)		36,289	2.98	0.68
6.0～ (%)			137 (0.7)	5,865 (31.8)	8,998 (48.8)	2,828 (15.3)	501 (2.7)	84 (0.5)	13 (0.1)	1 (0.0)	18,427 (100.0)		18,427	3.35	0.76
7.0～ (%)			8 (0.1)	1,334 (18.8)	3,438 (48.4)	1,809 (25.5)	410 (5.8)	88 (1.2)	18 (0.3)	3 (0.0)	7,108 (100.0)		7,108	3.68	0.83
8.0～ (%)				205 (9.3)	956 (43.6)	717 (32.7)	249 (11.3)	52 (2.4)	9 (0.4)	7 (0.3)	2,195 (100.0)		2,195	4.02	0.92
9.0～ (%)		1 (0.1)		38 (3.2)	297 (24.6)	375 (31.1)	311 (25.8)	94 (7.8)	44 (3.7)	45 (3.7)	1,205 (100.0)		1,205	4.87	1.51
合計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.7)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	93 (0.1)	57 (0.0)	173,449 (100.0)		173,449	2.48	1.00
記載なし (%)									2 (1.9)	103 (98.1)	105 (100.0)	4,655	4,760	14.62	4.82
総計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
平均	-0.68	1.25	3.27	4.71	5.71	6.45	7.26	7.80	9.70	14.09	4.53		4.53		
標準偏差	0.68	0.70	0.86	0.98	1.11	1.32	1.78	2.18	3.48	4.24	1.65		1.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査