

表 2603 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	457 (19.4)	1,893 (80.5)	2 (0.1)								2,352 (100.0)		2,352	0.15	0.34
1.0～ (%)		2,384 (57.2)	1,778 (42.7)	6 (0.1)							4,168 (100.0)		4,168	0.92	0.25
2.0～ (%)		218 (2.1)	9,240 (86.9)	1,132 (10.6)	37 (0.3)	3 (0.0)	1 (0.0)				10,631 (100.0)		10,631	1.54	0.36
3.0～ (%)		3 (0.0)	7,720 (34.9)	13,060 (59.0)	1,239 (5.6)	93 (0.4)	5 (0.0)	1 (0.0)			22,121 (100.0)		22,121	2.17	0.48
4.0～ (%)		1 (0.0)	1,420 (4.8)	19,590 (65.6)	7,714 (25.8)	998 (3.3)	120 (0.4)	12 (0.0)	2 (0.0)		29,857 (100.0)		29,857	2.74	0.58
5.0～ (%)			77 (0.3)	8,461 (36.6)	11,865 (51.3)	2,309 (10.0)	340 (1.5)	62 (0.3)	7 (0.0)	1 (0.0)	23,122 (100.0)		23,122	3.22	0.65
6.0～ (%)			5 (0.0)	1,592 (14.0)	6,598 (58.2)	2,567 (22.6)	482 (4.3)	82 (0.7)	13 (0.1)	1 (0.0)	11,340 (100.0)		11,340	3.65	0.71
7.0～ (%)			3 (0.1)	177 (4.3)	1,836 (44.9)	1,585 (38.8)	380 (9.3)	85 (2.1)	16 (0.4)	3 (0.1)	4,085 (100.0)		4,085	4.06	0.78
8.0～ (%)				13 (1.1)	316 (26.4)	563 (47.1)	237 (19.8)	51 (4.3)	9 (0.8)	7 (0.6)	1,196 (100.0)		1,196	4.50	0.87
9.0～ (%)		1 (0.2)		3 (0.5)	62 (9.3)	201 (30.3)	244 (36.7)	83 (12.5)	36 (5.4)	34 (5.1)	664 (100.0)		664	5.41	1.49
合計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	46 (0.0)	109,536 (100.0)		109,536	2.66	1.04
記載なし (%)										70 (100.0)	70 (100.0)	2,909	2,979	14.81	4.57
総計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	116 (0.1)	109,606 (100.0)	2,909	112,515	2.67	1.09
平均	-0.66	1.08	2.95	4.43	5.54	6.35	7.12	7.65	9.26	13.41	4.50		4.50		
標準偏差	0.64	0.62	0.71	0.83	0.98	1.22	1.59	1.94	3.24	4.29	1.62		1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査