

表 2604 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	298 (22.2)	1,046 (77.8)									1,344 (100.0)		1,344	0.11	0.30
1.0～ (%)		1,999 (81.9)	441 (18.1)	1 (0.0)							2,441 (100.0)		2,441	0.76	0.22
2.0～ (%)		871 (13.8)	5,165 (82.1)	249 (4.0)	4 (0.1)	1 (0.0)					6,290 (100.0)		6,290	1.28	0.33
3.0～ (%)		34 (0.3)	8,719 (70.0)	3,504 (28.1)	196 (1.6)	9 (0.1)	1 (0.0)				12,463 (100.0)		12,463	1.79	0.43
4.0～ (%)			5,194 (31.4)	10,155 (61.3)	1,119 (6.8)	84 (0.5)	6 (0.0)				16,558 (100.0)		16,558	2.21	0.48
5.0～ (%)			1,124 (8.5)	9,561 (72.6)	2,247 (17.1)	219 (1.7)	14 (0.1)	2 (0.0)			13,167 (100.0)		13,167	2.56	0.52
6.0～ (%)			132 (1.9)	4,273 (60.3)	2,400 (33.9)	261 (3.7)	19 (0.3)	2 (0.0)			7,087 (100.0)		7,087	2.86	0.54
7.0～ (%)			5 (0.2)	1,157 (38.3)	1,602 (53.0)	224 (7.4)	30 (1.0)	3 (0.1)	2 (0.1)		3,023 (100.0)		3,023	3.17	0.58
8.0～ (%)				192 (19.2)	640 (64.1)	154 (15.4)	12 (1.2)	1 (0.1)			999 (100.0)		999	3.44	0.58
9.0～ (%)				35 (6.5)	235 (43.4)	174 (32.2)	67 (12.4)	11 (2.0)	8 (1.5)	11 (2.0)	541 (100.0)		541	4.22	1.25
合計 (%)	298 (0.5)	3,950 (6.2)	20,780 (32.5)	29,127 (45.6)	8,443 (13.2)	1,126 (1.8)	149 (0.2)	19 (0.0)	10 (0.0)	11 (0.0)	63,913 (100.0)		63,913	2.16	0.84
記載なし (%)									2 (5.7)	33 (94.3)	35 (100.0)	1,746	1,781	14.24	5.34
総計 (%)	298 (0.5)	3,950 (6.2)	20,780 (32.5)	29,127 (45.5)	8,443 (13.2)	1,126 (1.8)	149 (0.2)	19 (0.0)	12 (0.0)	44 (0.1)	63,948 (100.0)	1,746	65,694	2.17	0.89
平均	-0.72	1.44	3.59	5.13	6.33	7.18	8.96	10.81	13.32	16.92	4.58		4.58		
標準偏差	0.74	0.72	0.88	1.04	1.31	1.71	2.82	3.95	3.45	2.59	1.70		1.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査