

表 2612 体重減少量(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		5 (23.8)	6 (28.6)	8 (38.1)	1 (4.8)	1 (4.8)					21 (100.0)		21	1.84	1.02
0.4～ (%)	2 (4.0)	13 (26.0)	20 (40.0)	13 (26.0)	2 (4.0)						50 (100.0)		50	1.44	0.86
0.6～ (%)	8 (4.5)	40 (22.5)	72 (40.4)	50 (28.1)	7 (3.9)	1 (0.6)					178 (100.0)		178	1.54	0.89
0.8～ (%)	19 (2.3)	141 (16.9)	336 (40.4)	253 (30.4)	65 (7.8)	17 (2.0)	1 (0.1)				832 (100.0)		832	1.74	0.98
1.0～ (%)	44 (1.4)	434 (13.5)	1,208 (37.6)	1,083 (33.7)	349 (10.9)	85 (2.6)	6 (0.2)		1 (0.0)		3,210 (100.0)		3,210	1.92	0.97
1.2～ (%)	70 (0.8)	736 (8.4)	2,986 (34.2)	3,545 (40.6)	1,162 (13.3)	203 (2.3)	17 (0.2)	5 (0.1)		3 (0.0)	8,727 (100.0)		8,727	2.10	0.91
1.4～ (%)	64 (0.4)	929 (6.0)	4,905 (31.6)	7,135 (46.0)	2,150 (13.9)	283 (1.8)	42 (0.3)	4 (0.0)		1 (0.0)	15,513 (100.0)		15,513	2.19	0.83
1.6～ (%)	36 (0.2)	707 (4.5)	4,829 (30.8)	7,610 (48.6)	2,201 (14.1)	240 (1.5)	28 (0.2)	5 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	15,660 (100.0)		15,660	2.22	0.78
1.8～ (%)	24 (0.2)	376 (3.9)	3,099 (31.8)	4,852 (49.8)	1,228 (12.6)	125 (1.3)	22 (0.2)	2 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.1)	9,737 (100.0)		9,737	2.22	0.79
2.0～ (%)	8 (0.1)	205 (3.2)	2,027 (31.7)	3,114 (48.8)	884 (13.8)	103 (1.6)	20 (0.3)		6 (0.1)	18 (0.3)	6,385 (100.0)	1	6,386	2.28	0.97
合計 (%)	275 (0.5)	3,586 (5.9)	19,488 (32.3)	27,663 (45.9)	8,049 (13.3)	1,058 (1.8)	136 (0.2)	16 (0.0)	12 (0.0)	30 (0.0)	60,313 (100.0)	1	60,314	2.17	0.86
記載なし (%)	23 (0.6)	364 (10.0)	1,292 (35.5)	1,464 (40.3)	394 (10.8)	68 (1.9)	13 (0.4)	3 (0.1)		14 (0.4)	3,635 (100.0)	1,745	5,380	2.09	1.34
総計 (%)	298 (0.5)	3,950 (6.2)	20,780 (32.5)	29,127 (45.5)	8,443 (13.2)	1,126 (1.8)	149 (0.2)	19 (0.0)	12 (0.0)	44 (0.1)	63,948 (100.0)	1,746	65,694	2.17	0.89
平均	1.39	1.49	1.61	1.65	1.64	1.58	1.66	1.56	1.99	2.12	1.62	2.27	1.62		
標準偏差	0.34	0.33	0.31	0.30	0.30	0.32	0.33	0.24	0.38	0.46	0.31		0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査