

表 2617 体重減少量(kg) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	15 (6.3)	62 (26.1)	73 (30.7)	59 (24.8)	23 (9.7)	5 (2.1)		1 (0.4)			238 (100.0)		238	1.59	1.20
0.4～ (%)	124 (2.3)	951 (17.4)	2,005 (36.8)	1,749 (32.1)	527 (9.7)	82 (1.5)	11 (0.2)	4 (0.1)	2 (0.0)		5,455 (100.0)		5,455	1.80	1.00
0.6～ (%)	196 (0.6)	1,979 (5.8)	8,534 (25.0)	14,349 (42.0)	7,193 (21.1)	1,559 (4.6)	255 (0.7)	50 (0.1)	9 (0.0)	8 (0.0)	34,132 (100.0)	1	34,133	2.40	0.99
0.8～ (%)	73 (0.2)	915 (2.0)	6,673 (14.8)	18,998 (42.2)	13,604 (30.3)	3,713 (8.3)	801 (1.8)	135 (0.3)	34 (0.1)	25 (0.1)	44,971 (100.0)	4	44,975	2.80	0.98
1.0～ (%)	10 (0.1)	168 (1.0)	1,400 (8.7)	5,895 (36.6)	5,885 (36.6)	2,058 (12.8)	500 (3.1)	118 (0.7)	20 (0.1)	47 (0.3)	16,101 (100.0)	1	16,102	3.12	1.11
1.2～ (%)	3 (0.1)	21 (0.9)	157 (6.5)	717 (29.6)	930 (38.3)	406 (16.7)	118 (4.9)	47 (1.9)	9 (0.4)	18 (0.7)	2,426 (100.0)	2	2,428	3.41	1.42
1.4～ (%)		5 (1.9)	18 (6.8)	51 (19.2)	86 (32.5)	57 (21.5)	31 (11.7)	5 (1.9)	4 (1.5)	8 (3.0)	265 (100.0)	7	272	4.02	2.86
1.6～ (%)			4 (12.5)	5 (15.6)	12 (37.5)	9 (28.1)				2 (6.3)	32 (100.0)	2	34	4.29	3.75
1.8～ (%)			1 (25.0)	1 (25.0)						2 (50.0)	4 (100.0)	10	14	8.32	7.64
2.0～ (%)			2 (50.0)		1 (25.0)	1 (25.0)					4 (100.0)	24	28	2.67	1.43
合計 (%)	421 (0.4)	4,101 (4.0)	18,867 (18.2)	41,824 (40.4)	28,261 (27.3)	7,890 (7.6)	1,716 (1.7)	360 (0.3)	78 (0.1)	110 (0.1)	103,628 (100.0)	51	103,679	2.68	1.09
記載なし (%)	36 (0.6)	399 (6.7)	1,378 (23.1)	2,210 (37.0)	1,406 (23.5)	429 (7.2)	93 (1.6)	16 (0.3)	5 (0.1)	6 (0.1)	5,978 (100.0)	2,858	8,836	2.52	1.17
総計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	116 (0.1)	109,606 (100.0)	2,909	112,515	2.67	1.09
平均	0.68	0.71	0.78	0.84	0.89	0.93	0.96	0.99	1.00	1.12	0.85	1.94	0.85		
標準偏差	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.21	0.24	0.17	0.56	0.17		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査