

表 2618 体重減少量(kg) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	9 (6.9)	55 (42.0)	44 (33.6)	20 (15.3)	3 (2.3)						131 (100.0)		131	1.10	0.89
0.4～ (%)	90 (3.0)	694 (23.4)	1,355 (45.7)	704 (23.8)	107 (3.6)	13 (0.4)					2,963 (100.0)		2,963	1.48	0.83
0.6～ (%)	124 (0.7)	1,532 (9.1)	6,867 (40.8)	6,661 (39.6)	1,449 (8.6)	161 (1.0)	20 (0.1)	4 (0.0)	4 (0.0)	1 (0.0)	16,823 (100.0)		16,823	1.95	0.82
0.8～ (%)	44 (0.2)	1,030 (4.0)	7,909 (31.0)	12,510 (49.0)	3,522 (13.8)	455 (1.8)	46 (0.2)	4 (0.0)	5 (0.0)	11 (0.0)	25,536 (100.0)		25,536	2.24	0.79
1.0～ (%)	7 (0.1)	237 (2.0)	2,831 (23.3)	6,386 (52.6)	2,294 (18.9)	319 (2.6)	47 (0.4)	5 (0.0)	3 (0.0)	15 (0.1)	12,144 (100.0)	2	12,146	2.44	0.83
1.2～ (%)		37 (1.5)	445 (17.9)	1,279 (51.4)	600 (24.1)	99 (4.0)	18 (0.7)	4 (0.2)		5 (0.2)	2,487 (100.0)	1	2,488	2.63	0.97
1.4～ (%)	1 (0.4)	4 (1.4)	48 (17.2)	130 (46.6)	76 (27.2)	14 (5.0)	5 (1.8)			1 (0.4)	279 (100.0)	4	283	2.71	0.96
1.6～ (%)		1 (2.3)	11 (25.6)	13 (30.2)	12 (27.9)	3 (7.0)				3 (7.0)	43 (100.0)	2	45	3.43	3.84
1.8～ (%)			1 (12.5)	6 (75.0)						1 (12.5)	8 (100.0)	3	11	4.84	7.18
2.0～ (%)			1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)		1 (16.7)			2 (33.3)	6 (100.0)	4	10	9.45	9.96
合計 (%)	275 (0.5)	3,590 (5.9)	19,512 (32.3)	27,710 (45.9)	8,064 (13.3)	1,064 (1.8)	137 (0.2)	17 (0.0)	12 (0.0)	39 (0.1)	60,420 (100.0)	16	60,436	2.18	0.88
記載なし (%)	23 (0.7)	360 (10.2)	1,268 (35.9)	1,417 (40.2)	379 (10.7)	62 (1.8)	12 (0.3)	2 (0.1)		5 (0.1)	3,528 (100.0)	1,730	5,258	2.05	1.11
総計 (%)	298 (0.5)	3,950 (6.2)	20,780 (32.5)	29,127 (45.5)	8,443 (13.2)	1,126 (1.8)	149 (0.2)	19 (0.0)	12 (0.0)	44 (0.1)	63,948 (100.0)	1,746	65,694	2.17	0.89
平均	0.66	0.74	0.84	0.90	0.95	0.97	1.02	0.98	0.87	1.18	0.88	1.73	0.88		
標準偏差	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.21	0.21	0.17	0.37	0.18	0.40	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査