

表 2620 体重減少量(kg) %クレアチニン産生速度(%)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	153 (2.1)	1,262 (17.0)	2,608 (35.1)	2,345 (31.6)	811 (10.9)	185 (2.5)	48 (0.6)	9 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	7,424 (100.0)		7,424	1.87	1.07
60～ (%)	59 (1.0)	544 (9.4)	1,628 (28.1)	2,173 (37.6)	1,022 (17.7)	279 (4.8)	61 (1.1)	18 (0.3)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,786 (100.0)		5,786	2.26	1.09
70～ (%)	57 (0.6)	524 (5.9)	2,177 (24.4)	3,599 (40.4)	1,898 (21.3)	525 (5.9)	108 (1.2)	14 (0.2)	5 (0.1)	1 (0.0)	8,908 (100.0)	1	8,909	2.44	1.03
80～ (%)	48 (0.4)	507 (4.0)	2,580 (20.5)	5,214 (41.5)	3,132 (24.9)	817 (6.5)	194 (1.5)	46 (0.4)	14 (0.1)	7 (0.1)	12,559 (100.0)		12,559	2.60	1.03
90～ (%)	33 (0.2)	447 (2.8)	2,890 (18.1)	6,675 (41.7)	4,333 (27.1)	1,259 (7.9)	281 (1.8)	45 (0.3)	16 (0.1)	10 (0.1)	15,989 (100.0)		15,989	2.71	1.02
100～ (%)	22 (0.1)	334 (2.0)	2,575 (15.3)	6,968 (41.4)	5,083 (30.2)	1,447 (8.6)	297 (1.8)	73 (0.4)	10 (0.1)	9 (0.1)	16,818 (100.0)		16,818	2.80	0.98
110～ (%)	27 (0.2)	248 (1.6)	1,986 (13.2)	6,229 (41.4)	4,799 (31.9)	1,379 (9.2)	299 (2.0)	72 (0.5)	16 (0.1)	8 (0.1)	15,063 (100.0)		15,063	2.87	0.99
120～ (%)	10 (0.1)	120 (1.1)	1,326 (12.3)	4,415 (40.8)	3,630 (33.6)	1,041 (9.6)	219 (2.0)	43 (0.4)	5 (0.0)	10 (0.1)	10,819 (100.0)		10,819	2.92	0.98
130～ (%)	4 (0.1)	58 (1.0)	656 (10.8)	2,499 (41.0)	2,142 (35.1)	586 (9.6)	118 (1.9)	22 (0.4)	4 (0.1)	10 (0.2)	6,099 (100.0)		6,099	2.96	0.98
140～ (%)	8 (0.2)	54 (1.3)	434 (10.5)	1,700 (41.1)	1,404 (34.0)	370 (9.0)	88 (2.1)	18 (0.4)	6 (0.1)	52 (1.3)	4,134 (100.0)	17	4,151	3.08	1.67
合計 (%)	421 (0.4)	4,098 (4.0)	18,860 (18.2)	41,817 (40.4)	28,254 (27.3)	7,888 (7.6)	1,713 (1.7)	360 (0.3)	78 (0.1)	110 (0.1)	103,599 (100.0)	18	103,617	2.68	1.09
記載なし (%)	36 (0.6)	402 (6.7)	1,385 (23.1)	2,217 (36.9)	1,413 (23.5)	431 (7.2)	96 (1.6)	16 (0.3)	5 (0.1)	6 (0.1)	6,007 (100.0)	2,891	8,898	2.52	1.18
総計 (%)	457 (0.4)	4,500 (4.1)	20,245 (18.5)	44,034 (40.2)	29,667 (27.1)	8,319 (7.6)	1,809 (1.7)	376 (0.3)	83 (0.1)	116 (0.1)	109,606 (100.0)	2,909	112,515	2.67	1.09
平均	71.49	74.92	89.89	100.13	104.88	105.26	104.78	104.72	104.76	139.97	98.98	227.97	99.00		
標準偏差	30.36	28.84	26.99	24.45	22.53	21.91	22.54	21.93	22.22	40.86	25.58	51.42	25.64		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査