

表 2624 体重減少量(kg) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	1 (0.2)	30 (5.0)	129 (21.3)	243 (40.2)	135 (22.3)	49 (8.1)	16 (2.6)	2 (0.3)			605 (100.0)	3	608	2.61	1.07
7.0～ (%)	2 (0.2)	24 (2.9)	131 (15.6)	343 (40.9)	212 (25.3)	92 (11.0)	26 (3.1)	7 (0.8)	2 (0.2)		839 (100.0)	3	842	2.84	1.12
7.5～ (%)	8 (0.2)	89 (2.7)	613 (18.5)	1,299 (39.3)	894 (27.0)	283 (8.6)	89 (2.7)	23 (0.7)	6 (0.2)	5 (0.2)	3,309 (100.0)	36	3,345	2.78	1.16
8.0～ (%)	24 (0.2)	356 (3.2)	2,102 (19.2)	4,641 (42.4)	2,768 (25.3)	812 (7.4)	177 (1.6)	50 (0.5)	8 (0.1)	16 (0.1)	10,954 (100.0)	68	11,022	2.67	1.11
8.4～ (%)	11 (0.3)	100 (3.2)	666 (21.1)	1,310 (41.6)	785 (24.9)	219 (7.0)	41 (1.3)	11 (0.3)	3 (0.1)	3 (0.1)	3,149 (100.0)	22	3,171	2.62	1.03
8.5～ (%)	130 (0.3)	1,437 (3.7)	8,388 (21.7)	16,777 (43.4)	8,999 (23.3)	2,316 (6.0)	452 (1.2)	83 (0.2)	19 (0.0)	27 (0.1)	38,628 (100.0)	235	38,863	2.56	1.02
9.0～ (%)	206 (0.4)	2,301 (4.5)	12,125 (23.8)	21,732 (42.6)	11,259 (22.1)	2,705 (5.3)	534 (1.0)	100 (0.2)	29 (0.1)	40 (0.1)	51,031 (100.0)	304	51,335	2.49	1.02
9.5～ (%)	178 (0.5)	1,932 (5.4)	8,818 (24.7)	15,058 (42.2)	7,509 (21.1)	1,708 (4.8)	348 (1.0)	65 (0.2)	9 (0.0)	39 (0.1)	35,664 (100.0)	228	35,892	2.43	1.05
10.0～ (%)	27 (0.6)	272 (6.0)	1,219 (27.0)	1,847 (41.0)	877 (19.5)	200 (4.4)	49 (1.1)	10 (0.2)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,507 (100.0)	29	4,536	2.38	1.12
10.1～ (%)	70 (0.6)	762 (6.6)	3,100 (26.7)	4,805 (41.4)	2,234 (19.3)	489 (4.2)	106 (0.9)	17 (0.1)	10 (0.1)	6 (0.1)	11,599 (100.0)	82	11,681	2.35	1.02
10.5～ (%)	45 (0.8)	475 (8.4)	1,552 (27.5)	2,232 (39.5)	1,045 (18.5)	228 (4.0)	51 (0.9)	13 (0.2)	2 (0.0)	9 (0.2)	5,652 (100.0)	60	5,712	2.30	1.08
11.0～ (%)	21 (1.1)	197 (10.6)	559 (30.0)	708 (38.0)	310 (16.6)	56 (3.0)	4 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.2)	1,862 (100.0)	29	1,891	2.15	1.07
11.5～ (%)	6 (0.9)	91 (13.5)	226 (33.6)	233 (34.7)	87 (12.9)	24 (3.6)	4 (0.6)	1 (0.1)			672 (100.0)	6	678	2.05	1.03
12.0～ (%)	3 (0.7)	91 (20.6)	161 (36.5)	127 (28.8)	47 (10.7)	7 (1.6)	4 (0.9)		1 (0.2)		441 (100.0)	5	446	1.82	1.04
合計 (%)	732 (0.4)	8,157 (4.8)	39,789 (23.6)	71,355 (42.2)	37,161 (22.0)	9,188 (5.4)	1,901 (1.1)	384 (0.2)	92 (0.1)	153 (0.1)	168,912 (100.0)	1,110	170,022	2.49	1.05
記載なし (%)	23 (0.5)	293 (6.3)	1,236 (26.6)	1,806 (38.9)	949 (20.4)	257 (5.5)	57 (1.2)	11 (0.2)	3 (0.1)	7 (0.2)	4,642 (100.0)	3,545	8,187	2.42	1.17
総計 (%)	755 (0.4)	8,450 (4.9)	41,025 (23.6)	73,161 (42.2)	38,110 (22.0)	9,445 (5.4)	1,958 (1.1)	395 (0.2)	95 (0.1)	160 (0.1)	173,554 (100.0)	4,655	178,209	2.49	1.05
平均	9.46	9.47	9.32	9.23	9.18	9.10	9.07	9.01	9.13	9.26	9.24	9.32	9.24		
標準偏差	0.80	0.85	0.75	0.72	0.71	0.73	0.78	0.80	0.86	0.74	0.74	0.82	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査