

表 2627 体重減少量(kg) PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	4 (0.3)	73 (6.1)	335 (28.0)	503 (42.0)	227 (19.0)	40 (3.3)	11 (0.9)	4 (0.3)			1,197 (100.0)	2	1,199	2.33	0.97
20～ (%)	7 (0.5)	95 (6.4)	387 (26.1)	643 (43.3)	265 (17.8)	71 (4.8)	12 (0.8)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,485 (100.0)	7	1,492	2.37	1.00
35～ (%)	6 (0.5)	72 (5.4)	343 (25.9)	553 (41.8)	269 (20.3)	67 (5.1)	10 (0.8)	2 (0.2)		1 (0.1)	1,323 (100.0)	7	1,330	2.42	1.13
50～ (%)	7 (0.4)	84 (4.3)	466 (23.7)	848 (43.1)	420 (21.4)	120 (6.1)	15 (0.8)	2 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	1,967 (100.0)	10	1,977	2.50	1.02
75～ (%)	6 (0.3)	64 (3.7)	374 (21.6)	761 (44.0)	383 (22.1)	120 (6.9)	20 (1.2)	2 (0.1)		1 (0.1)	1,731 (100.0)	5	1,736	2.57	1.00
100～ (%)	7 (0.5)	51 (3.6)	304 (21.7)	602 (43.0)	323 (23.1)	85 (6.1)	23 (1.6)	3 (0.2)	1 (0.1)		1,399 (100.0)	10	1,409	2.55	0.99
125～ (%)	1 (0.1)	38 (4.2)	174 (19.1)	401 (44.0)	232 (25.4)	52 (5.7)	10 (1.1)	3 (0.3)		1 (0.1)	912 (100.0)	3	915	2.60	0.99
150～ (%)		2 (7.1)	7 (25.0)	12 (42.9)	6 (21.4)	1 (3.6)					28 (100.0)		28	2.29	0.81
151～ (%)	2 (0.3)	21 (2.8)	153 (20.5)	315 (42.2)	187 (25.1)	51 (6.8)	16 (2.1)		1 (0.1)		746 (100.0)	1	747	2.63	0.99
180～ (%)	1 (0.2)	20 (3.8)	107 (20.3)	204 (38.6)	149 (28.2)	37 (7.0)	6 (1.1)	3 (0.6)		1 (0.2)	528 (100.0)		528	2.63	1.05
210～ (%)		10 (2.7)	63 (17.2)	144 (39.3)	100 (27.3)	43 (11.7)	5 (1.4)	1 (0.3)			366 (100.0)		366	2.75	0.99
240～ (%)	1 (0.2)	15 (3.6)	65 (15.6)	191 (45.7)	98 (23.4)	36 (8.6)	8 (1.9)	4 (1.0)			418 (100.0)	1	419	2.72	1.03
300～ (%)		2 (1.1)	23 (13.0)	78 (44.1)	55 (31.1)	13 (7.3)	4 (2.3)	2 (1.1)			177 (100.0)		177	2.88	0.91
350～ (%)		2 (1.9)	25 (23.8)	40 (38.1)	27 (25.7)	5 (4.8)	4 (3.8)	1 (1.0)		1 (1.0)	105 (100.0)		105	2.74	1.40
400～ (%)	2 (1.6)	2 (1.6)	22 (17.7)	53 (42.7)	33 (26.6)	7 (5.6)	3 (2.4)	2 (1.6)			124 (100.0)		124	2.69	1.10
500～ (%)	1 (0.7)	6 (3.9)	28 (18.4)	50 (32.9)	49 (32.2)	12 (7.9)	5 (3.3)	1 (0.7)			152 (100.0)		152	2.75	1.10
合計 (%)	45 (0.4)	557 (4.4)	2,876 (22.7)	5,398 (42.6)	2,823 (22.3)	760 (6.0)	152 (1.2)	32 (0.3)	7 (0.1)	8 (0.1)	12,658 (100.0)	46	12,704	2.52	1.03
記載なし (%)	2 (0.7)	21 (7.0)	110 (36.5)	111 (36.9)	42 (14.0)	9 (3.0)	3 (1.0)	1 (0.3)		2 (0.7)	301 (100.0)	11	312	2.24	1.61
総計 (%)	47 (0.4)	578 (4.5)	2,986 (23.0)	5,509 (42.5)	2,865 (22.1)	769 (5.9)	155 (1.2)	33 (0.3)	7 (0.1)	10 (0.1)	12,959 (100.0)	57	13,016	2.52	1.04
平均	117.82	86.29	95.49	103.77	118.21	120.29	155.86	170.28	73.43	123.00	106.17	76.87	106.06		
標準偏差	195.07	94.18	110.64	103.21	118.25	105.27	198.02	142.47	49.07	116.38	110.83	48.68	110.69		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査