

表 2635 体重減少量(kg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	58	661	3,441	8,450	6,223	1,978	375	52	13	22	21,273	503	21,776	2.78	1.08
(%)	(0.3)	(3.1)	(16.2)	(39.7)	(29.3)	(9.3)	(1.8)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	39	659	3,959	6,204	1,791	213	25	7	3	8	12,908	287	13,195	2.22	0.84
(%)	(0.3)	(5.1)	(30.7)	(48.1)	(13.9)	(1.7)	(0.2)	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
合計	97	1,320	7,400	14,654	8,014	2,191	400	59	16	30	34,181	790	34,971	2.57	1.03
(%)	(0.3)	(3.9)	(21.6)	(42.9)	(23.4)	(6.4)	(1.2)	(0.2)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	97	1,320	7,400	14,654	8,014	2,191	400	59	16	30	34,181	790	34,971	2.57	1.03
(%)	(0.3)	(3.9)	(21.6)	(42.9)	(23.4)	(6.4)	(1.2)	(0.2)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査