

表 2636 体重減少量(kg) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

年齢	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	2.30	
15歳～ (%)	2 (1.7)	4 (3.4)	18 (15.1)	45 (37.8)	35 (29.4)	11 (9.2)	4 (3.4)				119 (100.0)	5	124	2.77	1.14
30歳～ (%)	6 (0.3)	42 (2.0)	228 (10.9)	650 (31.0)	690 (32.9)	347 (16.5)	107 (5.1)	20 (1.0)	4 (0.2)	4 (0.2)	2,098 (100.0)	38	2,136	3.17	1.18
45歳～ (%)	25 (0.3)	198 (2.5)	1,198 (15.0)	2,839 (35.5)	2,483 (31.0)	1,017 (12.7)	203 (2.5)	25 (0.3)	6 (0.1)	6 (0.1)	8,000 (100.0)	182	8,182	2.92	1.10
60歳～ (%)	37 (0.2)	675 (4.1)	3,598 (21.7)	7,650 (46.1)	3,823 (23.0)	711 (4.3)	77 (0.5)	12 (0.1)	5 (0.0)	12 (0.1)	16,600 (100.0)	363	16,963	2.49	0.93
75歳～ (%)	27 (0.4)	368 (5.2)	2,224 (31.4)	3,373 (47.6)	973 (13.7)	104 (1.5)	9 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.1)	7,088 (100.0)	195	7,283	2.20	0.90
90歳～ (%)		33 (12.0)	134 (48.7)	96 (34.9)	10 (3.6)	1 (0.4)				1 (0.4)	275 (100.0)	7	282	1.85	1.42
合計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	64.42	68.62	68.58	66.12	61.31	55.71	51.04	50.34	54.19	63.57	64.74	65.80	64.76		
標準偏差	14.07	11.72	11.62	11.45	11.62	11.10	10.41	11.52	14.77	14.34	12.16	12.57	12.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査