

表 2637 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	34 (0.4)	408 (4.9)	1,766 (21.0)	3,368 (40.1)	2,020 (24.1)	629 (7.5)	125 (1.5)	24 (0.3)	8 (0.1)	13 (0.2)	8,395 (100.0)	220	8,615	2.60	1.12
5年～ (%)	30 (0.3)	347 (3.5)	1,905 (19.3)	4,095 (41.5)	2,549 (25.8)	760 (7.7)	146 (1.5)	22 (0.2)	5 (0.1)	9 (0.1)	9,868 (100.0)	248	10,116	2.66	1.08
10年～ (%)	13 (0.2)	198 (3.3)	1,181 (19.5)	2,582 (42.6)	1,551 (25.6)	443 (7.3)	80 (1.3)	7 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	6,059 (100.0)	135	6,194	2.64	0.98
15年～ (%)	4 (0.1)	123 (3.2)	827 (21.4)	1,783 (46.2)	906 (23.5)	186 (4.8)	30 (0.8)	3 (0.1)			3,862 (100.0)	62	3,924	2.53	0.89
20年～ (%)	6 (0.2)	87 (3.4)	650 (25.2)	1,235 (47.8)	486 (18.8)	95 (3.7)	16 (0.6)	2 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	2,581 (100.0)	56	2,637	2.42	0.92
25年～ (%)	6 (0.4)	67 (4.1)	453 (27.9)	782 (48.1)	267 (16.4)	47 (2.9)	2 (0.1)	1 (0.1)			1,625 (100.0)	26	1,651	2.32	0.83
30年～ (%)	2 (0.2)	50 (4.6)	354 (32.4)	501 (45.8)	158 (14.5)	25 (2.3)	1 (0.1)			2 (0.2)	1,093 (100.0)	30	1,123	2.25	1.02
35年～ (%)	1 (0.2)	29 (5.0)	220 (38.2)	254 (44.1)	65 (11.3)	6 (1.0)				1 (0.2)	576 (100.0)	11	587	2.10	0.79
40年～ (%)	1 (0.8)	11 (9.0)	44 (36.1)	54 (44.3)	12 (9.8)						122 (100.0)	2	124	1.98	0.79
合計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	9.74	11.19	12.64	11.86	10.27	8.91	8.12	7.36	6.75	9.70	11.38	10.61	11.36		
標準偏差	9.12	9.45	9.74	8.83	7.55	6.43	5.42	5.58	4.99	9.88	8.68	8.51	8.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査