

表 2641 体重減少量(kg) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												8	8		
20～ (%)			2 (50.0)	2 (50.0)							4 (100.0)	2	6	1.83	0.46
30～ (%)	2 (0.8)	26 (10.3)	103 (40.9)	98 (38.9)	22 (8.7)	1 (0.4)					252 (100.0)	2	254	1.88	0.79
40～ (%)	8 (0.3)	173 (5.5)	876 (28.0)	1,509 (48.2)	502 (16.0)	55 (1.8)	4 (0.1)		1 (0.0)	5 (0.2)	3,133 (100.0)		3,133	2.28	1.00
50～ (%)	23 (0.3)	250 (3.3)	1,448 (18.8)	3,568 (46.4)	1,969 (25.6)	374 (4.9)	28 (0.4)	8 (0.1)	3 (0.0)	11 (0.1)	7,682 (100.0)	1	7,683	2.58	0.95
60～ (%)	16 (0.3)	150 (2.4)	789 (12.9)	2,332 (38.0)	2,172 (35.4)	584 (9.5)	83 (1.4)	6 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	6,136 (100.0)	1	6,137	2.87	1.01
70～ (%)	7 (0.3)	47 (1.8)	178 (6.9)	727 (28.0)	1,047 (40.4)	492 (19.0)	88 (3.4)	6 (0.2)			2,592 (100.0)		2,592	3.23	0.99
80～ (%)	2 (0.2)	11 (1.2)	38 (4.0)	165 (17.5)	357 (37.8)	297 (31.4)	65 (6.9)	8 (0.8)	1 (0.1)	1 (0.1)	945 (100.0)	2	947	3.65	1.05
90～ (%)		3 (0.9)	6 (1.7)	40 (11.4)	116 (33.1)	113 (32.3)	57 (16.3)	13 (3.7)	1 (0.3)	1 (0.3)	350 (100.0)		350	4.05	1.12
100～ (%)		1 (0.9)		6 (5.7)	30 (28.3)	37 (34.9)	28 (26.4)	3 (2.8)	1 (0.9)		106 (100.0)		106	4.41	0.99
110～ (%)				2 (4.8)	4 (9.5)	15 (35.7)	15 (35.7)	4 (9.5)	2 (4.8)		42 (100.0)		42	4.90	1.11
120～ (%)			1 (3.2)	1 (3.2)	4 (12.9)	10 (32.3)	7 (22.6)	4 (12.9)	2 (6.5)	2 (6.5)	31 (100.0)		31	5.19	1.73
合計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	16	21,289	2.78	1.08
記載なし (%)												487	487		
総計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	503	21,776	2.78	1.08
平均	59.22	56.24	55.57	58.27	63.67	71.11	80.46	87.27	86.16	63.57	61.03	29.46	61.01		
標準偏差	10.32	10.34	9.42	9.75	11.30	13.86	17.02	23.76	31.53	25.47	12.14	27.27	12.19		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査