

表 2642 体重減少量(kg) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)	1 (1.8)	13 (22.8)	34 (59.6)	8 (14.0)						1 (1.8)	57 (100.0)	4	61	1.59	1.54
30～ (%)	11 (0.5)	182 (8.5)	974 (45.5)	851 (39.7)	110 (5.1)	11 (0.5)	1 (0.0)			1 (0.0)	2,141 (100.0)	1	2,142	1.89	0.78
40～ (%)	18 (0.3)	307 (5.3)	1,937 (33.3)	2,927 (50.3)	592 (10.2)	29 (0.5)	1 (0.0)		2 (0.0)	6 (0.1)	5,819 (100.0)	1	5,820	2.13	0.79
50～ (%)	9 (0.3)	120 (3.6)	791 (23.8)	1,734 (52.2)	606 (18.2)	55 (1.7)	7 (0.2)	3 (0.1)			3,325 (100.0)		3,325	2.36	0.78
60～ (%)		31 (2.8)	174 (15.9)	530 (48.4)	301 (27.5)	51 (4.7)	6 (0.5)	1 (0.1)			1,094 (100.0)		1,094	2.62	0.85
70～ (%)		5 (1.6)	36 (11.3)	118 (37.1)	120 (37.7)	34 (10.7)	4 (1.3)		1 (0.3)		318 (100.0)		318	2.97	0.89
80～ (%)		1 (0.8)	10 (7.9)	33 (26.2)	48 (38.1)	27 (21.4)	4 (3.2)	3 (2.4)			126 (100.0)		126	3.37	1.05
90～ (%)			3 (14.3)	1 (4.8)	12 (57.1)	4 (19.0)	1 (4.8)				21 (100.0)		21	3.54	1.09
100～ (%)				1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)					3 (100.0)		3	3.47	1.04
110～ (%)				1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)				4 (100.0)		4	3.82	1.26
120～ (%)															
合計 (%)	39 (0.3)	659 (5.1)	3,959 (30.7)	6,204 (48.1)	1,791 (13.9)	213 (1.7)	25 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.0)	8 (0.1)	12,908 (100.0)	9	12,917	2.22	0.84
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	39 (0.3)	659 (5.1)	3,959 (30.7)	6,204 (48.1)	1,791 (13.9)	213 (1.7)	25 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.0)	8 (0.1)	12,908 (100.0)	287	13,195	2.22	0.84
平均	43.64	44.84	45.63	48.82	54.53	63.12	68.98	67.66	54.10	39.42	48.70	22.30	48.68		
標準偏差	7.66	8.63	8.45	8.95	11.41	14.80	17.85	15.42	17.68	4.57	9.99	12.27	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査