

表 2643 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	97 (16.5)	489 (83.3)	1 (0.2)								587 (100.0)		587	0.15	0.32
1.0～ (%)		688 (63.1)	400 (36.7)	3 (0.3)							1,091 (100.0)		1,091	0.89	0.25
2.0～ (%)		139 (4.6)	2,601 (85.8)	281 (9.3)	9 (0.3)						3,030 (100.0)		3,030	1.48	0.36
3.0～ (%)		4 (0.1)	3,089 (44.8)	3,416 (49.6)	356 (5.2)	27 (0.4)		1 (0.0)			6,893 (100.0)		6,893	2.08	0.51
4.0～ (%)			1,117 (11.9)	6,002 (64.0)	1,993 (21.3)	229 (2.4)	34 (0.4)	2 (0.0)			9,377 (100.0)		9,377	2.60	0.60
5.0～ (%)			174 (2.3)	3,611 (48.6)	2,896 (39.0)	646 (8.7)	85 (1.1)	8 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	7,424 (100.0)		7,424	3.04	0.70
6.0～ (%)			18 (0.5)	1,101 (29.6)	1,856 (49.8)	638 (17.1)	97 (2.6)	13 (0.3)	2 (0.1)		3,725 (100.0)		3,725	3.40	0.73
7.0～ (%)				214 (15.2)	680 (48.3)	410 (29.1)	90 (6.4)	13 (0.9)	1 (0.1)		1,408 (100.0)		1,408	3.76	0.79
8.0～ (%)				23 (5.3)	186 (42.7)	168 (38.5)	54 (12.4)	3 (0.7)		2 (0.5)	436 (100.0)		436	4.11	0.85
9.0～ (%)				3 (1.6)	38 (20.0)	73 (38.4)	40 (21.1)	19 (10.0)	10 (5.3)	7 (3.7)	190 (100.0)		190	4.94	1.34
合計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.7)	14,654 (42.9)	8,014 (23.5)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	10 (0.0)	34,161 (100.0)		34,161	2.56	0.98
記載なし (%)										20 (100.0)	20 (100.0)	790	810	14.64	4.61
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	-0.68	1.19	3.24	4.67	5.65	6.41	6.99	8.00	10.49	12.75	4.59		4.59		
標準偏差	0.59	0.69	0.83	0.95	1.09	1.29	1.55	2.32	3.84	4.02	1.59		1.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査