

表 2644 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	58 (16.0)	304 (83.7)	1 (0.3)								363 (100.0)		363	0.15	0.34
1.0～ (%)		346 (52.8)	306 (46.7)	3 (0.5)							655 (100.0)		655	0.95	0.26
2.0～ (%)		11 (0.6)	1,633 (86.4)	237 (12.5)	8 (0.4)						1,889 (100.0)		1,889	1.58	0.35
3.0～ (%)			1,298 (30.1)	2,661 (61.8)	320 (7.4)	26 (0.6)		1 (0.0)			4,306 (100.0)		4,306	2.24	0.50
4.0～ (%)			196 (3.3)	3,788 (63.2)	1,755 (29.3)	216 (3.6)	33 (0.6)	2 (0.0)			5,990 (100.0)		5,990	2.81	0.58
5.0～ (%)			7 (0.2)	1,484 (32.4)	2,403 (52.4)	598 (13.0)	83 (1.8)	8 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.0)	4,587 (100.0)		4,587	3.31	0.67
6.0～ (%)				251 (11.1)	1,314 (58.0)	593 (26.2)	92 (4.1)	13 (0.6)	2 (0.1)		2,265 (100.0)		2,265	3.72	0.68
7.0～ (%)				25 (3.0)	356 (42.4)	364 (43.3)	84 (10.0)	10 (1.2)	1 (0.1)		840 (100.0)		840	4.11	0.71
8.0～ (%)				1 (0.4)	61 (23.6)	142 (54.8)	50 (19.3)	3 (1.2)		2 (0.8)	259 (100.0)		259	4.51	0.78
9.0～ (%)					6 (5.6)	39 (36.4)	33 (30.8)	15 (14.0)	7 (6.5)	7 (6.5)	107 (100.0)		107	5.46	1.34
合計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	10 (0.0)	21,261 (100.0)		21,261	2.77	1.02
記載なし (%)										12 (100.0)	12 (100.0)	503	515	15.86	5.50
総計 (%)	58 (0.3)	661 (3.1)	3,441 (16.2)	8,450 (39.7)	6,223 (29.3)	1,978 (9.3)	375 (1.8)	52 (0.2)	13 (0.1)	22 (0.1)	21,273 (100.0)	503	21,776	2.78	1.08
平均	-0.66	0.98	2.90	4.37	5.47	6.32	6.91	7.79	9.63	12.75	4.58		4.58		
標準偏差	0.61	0.60	0.68	0.81	0.98	1.19	1.47	2.27	3.36	4.02	1.57		1.57		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査