

表 2645 体重減少量(kg) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	39 (17.4)	185 (82.6)									224 (100.0)		224	0.14	0.29
1.0～ (%)		342 (78.4)	94 (21.6)								436 (100.0)		436	0.80	0.22
2.0～ (%)		128 (11.2)	968 (84.8)	44 (3.9)	1 (0.1)						1,141 (100.0)		1,141	1.31	0.32
3.0～ (%)		4 (0.2)	1,791 (69.2)	755 (29.2)	36 (1.4)	1 (0.0)					2,587 (100.0)		2,587	1.81	0.41
4.0～ (%)			921 (27.2)	2,214 (65.4)	238 (7.0)	13 (0.4)	1 (0.0)				3,387 (100.0)		3,387	2.25	0.46
5.0～ (%)			167 (5.9)	2,127 (75.0)	493 (17.4)	48 (1.7)	2 (0.1)				2,837 (100.0)		2,837	2.60	0.49
6.0～ (%)			18 (1.2)	850 (58.2)	542 (37.1)	45 (3.1)	5 (0.3)				1,460 (100.0)		1,460	2.91	0.52
7.0～ (%)				189 (33.3)	324 (57.0)	46 (8.1)	6 (1.1)	3 (0.5)			568 (100.0)		568	3.23	0.59
8.0～ (%)				22 (12.4)	125 (70.6)	26 (14.7)	4 (2.3)				177 (100.0)		177	3.52	0.56
9.0～ (%)				3 (3.6)	32 (38.6)	34 (41.0)	7 (8.4)	4 (4.8)	3 (3.6)		83 (100.0)		83	4.26	1.01
合計 (%)	39 (0.3)	659 (5.1)	3,959 (30.7)	6,204 (48.1)	1,791 (13.9)	213 (1.7)	25 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.0)		12,900 (100.0)		12,900	2.22	0.80
記載なし (%)										8 (100.0)	8 (100.0)	287	295	12.81	1.90
総計 (%)	39 (0.3)	659 (5.1)	3,959 (30.7)	6,204 (48.1)	1,791 (13.9)	213 (1.7)	25 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.0)	8 (0.1)	12,908 (100.0)	287	13,195	2.22	0.84
平均	-0.71	1.41	3.54	5.08	6.27	7.23	8.21	9.59	14.21		4.61		4.61		
標準偏差	0.56	0.71	0.84	0.98	1.23	1.78	2.17	2.18	4.17		1.62		1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査