

表 2650 体重減少量(kg) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		2 (66.7)	1 (33.3)								3 (100.0)		3	0.93	0.32
2～ (%)	1 (0.7)	36 (25.0)	67 (46.5)	33 (22.9)	7 (4.9)						144 (100.0)	3	147	1.50	0.82
4～ (%)	14 (1.5)	143 (15.7)	390 (43.0)	273 (30.1)	75 (8.3)	12 (1.3)				1 (0.1)	908 (100.0)	10	918	1.79	1.03
6～ (%)	22 (0.6)	276 (7.4)	1,233 (33.1)	1,646 (44.2)	444 (11.9)	77 (2.1)	15 (0.4)	1 (0.0)	2 (0.1)	6 (0.2)	3,722 (100.0)	28	3,750	2.15	1.05
8～ (%)	23 (0.3)	371 (4.3)	2,291 (26.3)	4,096 (47.1)	1,572 (18.1)	268 (3.1)	54 (0.6)	6 (0.1)	5 (0.1)	10 (0.1)	8,696 (100.0)	51	8,747	2.37	0.96
10～ (%)	16 (0.2)	286 (2.8)	2,087 (20.7)	4,640 (45.9)	2,382 (23.6)	586 (5.8)	71 (0.7)	20 (0.2)	3 (0.0)	7 (0.1)	10,098 (100.0)	49	10,147	2.58	0.93
12～ (%)	18 (0.3)	129 (2.0)	924 (14.0)	2,734 (41.4)	2,065 (31.3)	605 (9.2)	115 (1.7)	13 (0.2)	1 (0.0)	3 (0.0)	6,607 (100.0)	31	6,638	2.83	0.98
14～ (%)	3 (0.1)	43 (1.5)	278 (9.9)	921 (32.8)	1,031 (36.7)	426 (15.2)	85 (3.0)	15 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,806 (100.0)	14	2,820	3.11	1.02
16～ (%)		13 (1.3)	72 (6.9)	261 (25.1)	415 (39.9)	213 (20.5)	59 (5.7)	4 (0.4)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,040 (100.0)	8	1,048	3.37	1.06
合計 (%)	97 (0.3)	1,299 (3.8)	7,343 (21.6)	14,604 (42.9)	7,991 (23.5)	2,187 (6.4)	399 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	29 (0.1)	34,024 (100.0)	194	34,218	2.57	1.03
記載なし (%)		21 (13.4)	57 (36.3)	50 (31.8)	23 (14.6)	4 (2.5)	1 (0.6)			1 (0.6)	157 (100.0)	596	753	2.10	1.11
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	9.11	9.01	9.72	10.55	11.64	12.50	12.94	12.69	11.68	9.74	10.72	10.27	10.72		
標準偏差	2.70	2.76	2.48	2.41	2.57	2.63	2.78	2.34	3.98	2.57	2.66	2.90	2.66		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査